



## Norsk/Svenska kärnområdet för flodkräfta



"Östen-Töck"

*INTERREG* IIIA  
SVERIGE - NORGE



EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

# Innehållsförteckning

## 1 Historik inom Kärnområdet

### 1.1 Illegal utplantering av signalkräfter

## 2 Grundläggande förutsättningar för flodkräfter

### 2.1 Vattentemperatur

### 2.2 Bottenstruktur

### 2.3 Vattenkemin

### 2.4 Kalcium

### 2.5 Järn

## 3 Begränsande faktorer i ett flodkräftbestånd

### 3.1 Abiotiska (icke biologiska) faktorer

#### 3.1.1 Temperatur

#### 3.1.2 Försurning

#### 3.1.3 Övergödning och förgiftning

#### 3.1.4 Reglering av vattendrag

#### 3.1.5 Grumling

### 3.2 Biotiska (biologiska) faktorer

#### 3.2.1 Predatorer på kräfter

#### 3.2.2 Överfiskning

#### 3.2.3 Mink

#### 3.2.4 Parasiter

## 4 Flodkräftans biologi

### 4.1 Könsmognad

### 4.2 Parning

### 4.3 Tillväxt

### 4.4 Aktivitet och vandringar

### 4.5 Föda

## 5 Kräftpest

### 5.1 Kräftpest – en svamp

### 5.2 Historik om kräftpesten

### 5.3 Myter och felaktiga påståenden

### 5.4 Kräftpestens spridning i samma vattensystem

### 5.5 Kräftpestens spridning mellan olika vattensystem

### 5.6 Signalkräfter sprider kräftpest

### 5.7 Illegala utsättningar av signalkräfter – största hotet mot flodkräftan

### 5.8 Lagstiftning för att förhindra spridning av kräftpest och signalkräfter

### 5.9 Praktiska råd till hur DU/NI kan förhindra spridning av kräftpest till ert flodkräftvatten

### 5.10 Att tänka på vid utsättning av fisk – för att förhindra spridning av kräftpest

### 5.11 För att säkerställa dig att DU inte medverkar till spridning av kräftpest...

### 5.12 Tänkbara metoder för att förhindra kräftpestens spridning i ett vattendrag

### 5.13 Sammanfattning av kräftpestspridning

## 6 Kräftvårdande åtgärder

### 6.1 Kalkning

### 6.2 Minkbekämpning

### 6.3 Biotopförbättrande åtgärder

### 6.4 Stödutfodring

### 6.5 Utplantering

### 6.6 Flyttning av kräfter

### 6.7 Spridning och nyetablering av kräfter med hjälp av sumpar

### 6.8 Regler för kräftfiske

### 6.9 Provfiske – Värdering av kräftbestånd utifrån fångst per insats

## 7 Skötselområde: Östen-Töck

### 7.1 Närmast kända signalkräftbestånd

### 7.2 Målsättning för skötselområdet

### 7.3 Skyddsplan för hela skötselområdet

### 7.4 Vandringshinder inom skötselområdet

### 7.5 Åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest inom skötselområdet

## 8 Driftplan för delområdet Östervallskog FVOF

### 8.1 Organisation och förvaltning

### 8.2 Sjöarna och vattendragen

### 8.3 Kalkning

### 8.4 Risken för spridning av kräftpest till FVOF

### 8.5 Mink

### 8.6 Kräftfiske

### 8.7 Åtgärder för hela FVOF

### 8.8 Ivarsbyälven

### 8.9 Vattenkemi

### 8.10 Historik om flodkräftorna fram tills idag

### 8.11 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

### 8.12 Förslag till åtgärder/handlingsprogram Ivarsbyälven

### 8.13-17 Östen/Strömmensjön

### 8.18-22 Rommenäsälven

### 8.23-27 Torpedalsälven

### 8.28-31 Kyrkebytjärn

### 8.32-36 Almtjärn

## 9 Driftplan för delområdet Töck - Hurrsjöarnas FVOF

### 9.1 Organisation och förvaltning

### 9.2 Sjöarna och vattendragen

### 9.3 Kalkning

### 9.4 Risken för spridning av kräftpest till FVOF

### 9.5 Var man teoretiskt kan stoppa en ankande pesthärd

### 9.6 Minkjakt

### 9.7 Kräftvårdande åtgärder för hela FVOF

### 9.8 Nedre Hurrsjön och Hånälven

### 9.9 Vattenkemi

### 9.10 Historik om flodkräftorna fram tills idag

### 9.11 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

### 9.12 Förslag till åtgärder/handlingsprogram

### 9.13-17 Töck och "Kanalen"

## Bilaga: Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräfter

# Norsk/Svenska kärnområdet för flodkräfta

Vid förra sekelskiftet fanns ca 30 000 bestånd av flodkräfta (*Astacus astacus*) i Sverige. Efter att den parasitiska svampsjukdomen, kräftpesten (*Aphanomyces astaci*), drabbade Sverige första gången 1907 har antalet flodkräftbestånd kraftigt minskat. På grund av flodkräftans starkt minskande förekomst klassificerades arten 1993 som hänsynskrävande i den dåvarande svenska databanken för hotade arter. Under perioden 1990 till 2000 minskade flodkräftan ytterligare med ca 20 % i Sverige, och i rödlistan från år 2000 lyftes flodkräftan från "hänsynskrävande" till "sårbar" (Art-databanken 2003). 1996 fanns uppskattningsvis 1500 kända flodkräftpopulationer i Sverige. 10 år senare, 2004, fanns ca 1000 bestånd av flodkräftor kvar varav ca 25 procent av dessa finns i Värmland och Dalsland.

Flodkräftan räknas internationellt som en hotad art och från och med 2005 kommer flodkräftan i Sverige att få större beskydd, från att tidigare ha varit "sårbar" kommer den att klassas som "starkt hotad" på ArtData-bankens rödlista för hotade arter, utslutande på grund av den illegala ut-sättningen av signalkräftor som sker i Sverige. På Norsk sida är flodkräftan "hänsynskrävande". Norge är det enda landet i Norden som ännu inte har signalkräftan (*Pacifastacus leniusculus*) i sin fauna.

Interreg-projektet Astacus har utlyst ett Kärnområde (karta 1) för flodkräfta. Målet med kärnområdet är ett långsiktigt bevarande och mångsidigt nyttjande av flodkräfta (*Astacus astacus*). Det geografiska området, Kärnområdet, omfattar ett i stort sett

lika stort område i Sverige och Norge, och är ett verkligt interregionalt område. Områdena som tillsammans bildar kärnområdet är delar av Värmland, Dalsland, Østfold, Akershus och Hedmark. Det är av stor vikt för såväl Sverige som Norge att detta gränsområde förblir ett kärnområde för flodkräfta. Målsättningen är att detta område skall förknippas med flodkräfta ur ett bevarande och nyttjandeperspektiv.

## 1. Historik inom kärnområdet

I slutet av 1950-talet insamlades fångstuppgifter i alla län med avseende på flodkräftor. I hela landet fångades enligt dessa uppgifter 348 ton flodkräftor. Mest kräftor fångades i Småland med Värmland på andra plats.

Den finns ingen sammanställning av när och var de första kräftpestubrotten skedde i Värmland och Dalsland. Enligt uppgift blev Värmland drabbad av kräftpest 1929-1930. Ett senare



Karta 1 . Kärnområde för flodkräftan

dokumenterat utbrott, som även gick upp i vattensystem i Norge, var pestutbrotten i Växan/Vrångsälven 1971-1974. Vrångsälven har sina källor söder om Kongsvinger i Norge och rinner förbi Charlottenberg och ingår i Byälvens avrinningsområde. Vrångsälven med tillhörande källsjöar var före pestutbrotten ett av Norges bästa kräftvatten. Enligt obekräftade uppgifter kom smittan in i Vrångsälven via utplantering av pestsmittade flodkräftor i Eda. Kräftpesten fick därmed fäste i systemet och kunde sedermera spridas uppström och in i Norge.

Tillstånd för inplantering av signalkräftor inom delar av Vänerens avrinningsområde började ges 1985 och i Värmlands län först 1989. Från Dalsland finns dock 6 tillstånd givna redan 1969 och ett tillstånd 1980. 1992 var antalet tillstånd för odling/utsättning av signalkräftor 18 stycken vardera i Värmlands och Älvsborgs län medan Göteborg och Bohusläns län fanns 2 tillstånd givna.

Efter 1992 har inga fler tillstånd beviljats i Värmland. Av de 18 beviljade tillstånden i Värmland fördelades dessa mellan 11 odlingar och på 8 utsätt-

ningar i naturliga vatten (tab.1).

### 1.1 Illegal utplantering av signalkräftor

Det absolut största hotet mot flodkräftan är spridningen av amerikanska kräftarter och då främst signalkräftan (*Pacifastacus leniusculus*). Dessa är bärare av kräftpestsvampen och därmed sprider signalkräftor kräftpesten. Till skillnad från de amerikanska kräftarterna är flodkräftan mycket känslig för kräftpest som förorsakar total utslagning av flodkräftor i de smittade vattnen. År 1969 gavs tillstånd till utplantering av signalkräftor i stora delar av södra Sverige men från och med 1994 får man inte tillstånd för utsättning av signalkräfta i Värmland och Dalsland. Problemet med illegal utplantering av signalkräfta är mycket påfallande. Via rykten och konkreta fångster med signalkräftor har projektet fått en uppfattning om hur allvarlig situationen är i Värmland och Dalsland. I Dalsland har man 2004 vetenskap om ca 8 kända lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, varav de två största sorgebarnen är det stora sjösystemet med Stora Le och Lelång. I

Värmland finns uppskattningsvis 40 – 45 lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, med tyngdpunkten på östra Värmland. Mörkertalet är förstås stort. Dessa signalkräftor befinner sig i avrinningsområden som fortfarande hyser flodkräftbestånd och utgör därmed ett mycket stort hot mot dessa.

## 2. Grundläggande förutsättningar för flodkräftor

Flodkräftan förekommer i många olika typer av vatten, från stora sjöar till små bäckar.

Avgörande för flodkräftans möjligheter att etablera sig i ett vatten är de lokala temperaturförhållandena, vattenkemin bottenstrukturen samt födotillgången.

### 2.1 Vattentemperatur

Kräftor är en varmvattenkrävande art, och temperaturen är den begränsande faktorn för utbredningen norr ut. Kräftor kräver en genomsnittlig vattentemperatur på 15°C eller högre under de 3 sommarmånaderna för att kunna upprätthålla goda och själproducerade bestånd. Vid låga vattentemperaturer under sommaren fördröjs kläckningen av kräftynglen. Om ynglen inte hunnit kläckts före juli månads utgång överlever knappast denna årsklass till påföljande sommar. I Värmland finns de nordligaste kräftbestånden norr om Torsby vid Östmark och Vitsand. Den högst belägna kända lokalen med flodkräftor i kärnområdet är en sjö i Värmland på 271 möh. Optimala växtförhållanden är vid 17 - 20°C. Utgången av sommarens väderförhållanden har sålunda stor påverkan på storleken av årets yngelkull samt årets tillväxt.

### 2.2 Bottenstruktur

Flodkräftan lever främst i strandnära och relativt grunda områden. Förekomsten påverkas starkt av tillgången till skyddsmöjligheter. Lämpliga miljöer för

**Tabell 1. Sjöar som givits tillstånd till utsättning av signalkräftor inom kärnområdet**

Sjö	Kommun	Tillståndsår
Botungen	Säffle	
Värmeln	Arvika	
Värmeln	Grums	
Aplungen	Sunne	
Grumsfjorden (Vänern)	Grums	
Vänern (Hammarö)	Hammarö	
Horn tjärn	Sunne	
Nästjärnet	Grums	
Lilla krokvattnet	?	1969
Långevattnet	Färgelanda	1969
Stora Skärbotjärnet	Bengtfors	1969
Åsnebotjärn	Bengtfors	1968
Ellenösjön	Färgelanda	1969
Östersjön	Färgelanda	1969?
Nären	Mellerud	1980?
Näsöln	Mellerud	1988
Lilla Hagtjärn	Ed	1989

arten är t ex. områden med stort inslag av sten av varierande storlek, rötter mm. eller områden dominerande av fasta bottenar (lera) i vilka kräftan själv kan gräva skyddande hål. Sådana miljöer finns ofta rikligt i näringsfattiga sjöar och i rinnande vatten.

### 2.3 Vattenkemin

Flodkräftan är en av de mest försurningskänsliga organismer som lever i våra sötvatten och kräver därmed ett rent och syrerikt vatten för att kunna existera. Det räcker med en dag med surt vatten, en surstöt efter ett häftigt regn vid fel tidpunkt på året, för att en årskull ska slås ut. Några absoluta gränser vad gäller vattenkemiska parametrar har inte gått att fastställa. Snarare sker successiva förändringar i en kräftpopulation vid ändrande vattenkemiska förhållanden.

Vid bedömning av ett vattens lämplighet för flodkräfta är det i huvudsak följande fyra parametrar (Tabell 2) som används som kriterier vad gäller vattenkvalitet: pH, alkalinitet (buffertförmåga dvs. vattnets förmåga att stå emot sur nederbörd utan att pH-värdet ändras), kalciumjonhalten ( $\text{Ca}^{2+}$ ) och halten lösta järnjoner ( $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ ).

De vattenkemiska förhållandena påverkar kräftorna olika kraftigt under olika delar av kräftans livscykel. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till vilka förhållanden som råder då kräftan är som känsligast. Tre perioder under året kan nämnas som speciellt avgörande för utvecklingen av ett kräftbestånd:

**1.** Vid parning och romsättning (september-november). Förhållandena vid befruktningen (romsättning) och de närmast veckorna därefter är helt av-



Flodkräfta till vänster och signalkräfta till höger. Lägg märke till de ljusa fläckarna på signalkräftans klor.

görande vad gäller utgången av nästkommande års årskull.

**2.** Kläckning av rommen och ynglens första skalbyte (mitten av juni – juli). Första skalbytet för ynglet sker ungefär 1-2 veckor efter att rommen kläckts.

**3.** Veckan före, under samt ca två veckor efter skalbyte.

Värdena i tabellen är inga absoluta gränsvärden utan det ena värdet påverkar det andra. T ex kan kalciumjoner motverka den skadliga inverkan som järnjoner kan ha. Detta innebär att ju högre halt av kalciumjoner ett vatten innehåller, desto större mängd järnjoner kan finnas utan att påverka kräftorna negativt. Generellt gäller alltså att ju högre pH-, alkalinitet-, och kalciumvärden desto bättre.

Utöver ovan nämnda kompliceras bilden ytterligare av att kräftan är bottenbunden och oftast mycket stationär. Det innebär att de vattenkemiska värdena som uppmätts i fria vattenmassan inte alltid är representativa för

de förhållanden som råder i kräftans absoluta närmiljö. T ex. kan kalciumhalten i fria vattenmassan visa låga kalciumjonhalter medan bottensubstraten kan bestå av kalkhaltiga leror, där kräftorna bygger sina bon och gångar. På detta sätt får alltså kräftorna tillgång till den mängd kalciumjoner som krävs t ex. för skaluppbyggnad.

### 2.4 Kalcium

I kräftans skal är kalcium ett viktigt byggelement. Innan skalbytet lagrar kräftan kalk (Ca) från det gamla skalet i blodet, hepatopancreas, det organ hos kräftan som motsvarar vår lever, och i kräftstenarna (gastroliter) som finns i kräftans mage. Efter skalbytet användes lagret av kalcium i blodet, hepatopancreas och i kräftstenarna till att bygga upp det nya skalet. Mängden lagrat kalcium i kräftan är inte tillräckligt utan kräftor måste även ta upp kalciumjoner direkt ur vattenmassan via gälarna, för att göra skalet hårt och robust. Därför måste det vara en viss kalciummängd i vattnet för att kräftan skall kunna leva där. En ökning av kalciumhalten i vattnet sker i samband med kalkning.

### 2.5 Järn

Det är inte helt klarlagt på vilket sätt kräftorna drabbas av höga halter av järnjoner i vattnet. En trolig förkla-

**Tabell 2 Riktlinjer för fyra viktiga vattenkemiska parametrar**

pH	> 6, 5
Alkalinitet	> 0, 1 mekv/l
Järn ( $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ )	< 0, 5 mg/l
Kalcium ( $\text{Ca}^{2+}$ )	> 4 mg/l

ring är att det sker en utfällning av järnoxid ("rost") på bl.a. kräftornas gälar. Detta kan leda till försämrad syreupptagningsförmåga, vilket ger upphov till stressreaktioner i kräftan som kan resultera i försämrad motståndskraft mot sjukdomar samt försämrad tillväxt och reproduktion. Speciellt under de första yngelstadierna samt i samband med skalbyten påverkas kräftan negativt av hög järnhalt i vattnet.

En orsak till höga halter av järnjoner i vattnet är att omgivande skog- och myrmarker är påverkade av sur nederbörd orsakar låga pH-värden i markskiktet. Detta medför att olika joner, bl.a. järnjoner, blir mer lättlösliga och från att tidigare ha varit bundna till partiklar i marken och i olika kemiska föreningar löses de nu ut av vatten med lågt pH-värde och transporteras ut i vattendragen. Genom markkalkning inom avrinningsområdet motverkas effekten av den sura nederbörden och järnet förblir bundet i marken.

### 3. Begränsande faktorer i ett flodkräftbestånd

Kräftornas utbredning och kräftbeståndens täthet bestäms av flera olika faktorer som kan verka var för

sig eller tillsammans genom mer eller mindre komplexa interaktioner. Vilken enskild faktor eller vilka komplex av faktorer som är den/de mest betydelsefulla är beroende av de lokala förutsättningarna och kan variera med tiden. Generellt kan man dela upp de begränsande faktorerna i sådana som är oberoende av kräftbeståndets täthet och sådana faktorer som är beroende av kräftbeståndet. De oberoende faktorerna av kräftbeståndet utgörs av icke biologiska (abiotiska) orsaker, oftast av fysikaliskt/kemiska faktorer som tex. klimat, vattenkemi mm. Medan de beroende faktorerna vanligen har biologiska orsaker (biotiska) som t ex. predation, konkurrens, parasiter mm. men kan också utgöras av t ex. förekomsten av skydd.

#### 3.1 Abiotiska (icke biologiska) faktorer

Av de täthetsberoende faktorerna är det framför allt temperatur, försurningspåverkan, samt förändrad vattenföring/vattenståndsförändringar som påverkat flodkräftans utbredning och beståndsstorlek under 1900-talet. Bortsett från klimatet, är de övriga faktorerna effekter av mänsklig aktivitet.

#### 3.1.1 Temperatur

Som det nämndes tidigare har vattentemperaturen en avgörande betydelse för utbredningen av kräftor, skalbyte och äggkläckning. Det sker en naturlig förändring av produktiviteten och därmed fångsten av kräftor i ett vatten från år till år bl.a. beroende på hur sommarens väder utvecklats sig. En varm försommar gynnar framför allt yngelproduktionen genom att ynglen kläcks tidigt, vilket medför att de hinner byta skal flera gånger och att äta upp sig inför vintern som är en svår tid för ynglen. Ju större och i bättre kondition ynglen är desto större chans har de att överleva vintern. Vid normala förhållanden når mindre än 5 % av de nykläckta kräftynglen vuxen ålder.

Vid bedömning om avkastningen av årets kräftfiske är hög eller låg måste man ta hänsyn till väderleksutvecklingen, dels årets sommar samt till hur sommaren för 5 år sedan utvecklade sig. Årets sommar avgör i vilket skede skalbytena befinner sig i. I regel fiskar man för tidigt i början på augusti, när kräftorna byter skal. De större kräftorna (ca 10 cm) man fiskar efter är motsvarande 5-åringar. Mängden 5-åringar man fiskar efter avgörs mycket av hur sommaren för fem år sedan utvecklade sig. Var försommaren för 5 år sedan kall och regning kan detta medföra att årets kräftfiske blir dåligt, av den anledning att det var få kräftor ur den årskullen som överlevde det första året och därmed finns det färre stora kräftor att fiska efter i år. Medan en bra sommar kan medföra ett mycket gott kräftfiske fem år senare.

#### 3.1.2 Försurning

Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH i vattnet. Kräftbeståndets täthet påverkas redan då pH faller under 6 och i gravt sura vatten saknas flodkräfta helt. Denna känslighet gäller framförallt de yngsta stadierna i livscykeln. Redan vid pH-värden mellan



Lidsjön, Gunnarskog i Arvika kommun. Kräftorna slogs ut under 1970-1980-talet pga försurning

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet



Teakersälven, igenväxt damm.

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel med ökad dödlighet som följd. Vid romläggning som sker under hösten medför surt vatten att rommen inte kan fästa på undersidan av honans stjärt på normalt sätt. Efter kläckningen av rommen har kräftynglen ett stort behov av att snabbt förkalka sitt skall. Detta sker genom att kalcium tas upp från det omgivande vattnet via gälarna. Denna process är mycket pH-känslig beroende på att lågt pH hindrar upptaget av kalcium. Vid pH-värdet under 6 är kalciumupptaget reducerat och vid pH 5 är det i stort sett helt blockerat. Samma förhållande gäller för vuxna kräftor, där skalömsningen utgör det skede i livscykelns känslighet för lågt pH är störst.

En bidragande orsak till att kräftan drabbas hårt vid försurningen av sjöar är att de i huvudsak uppehåller sig i sjöarnas strandzon. Denna del av sjön är oftast mer utsatt för försurningspåverkan än mer centralt belägna delar av sjön. På motsvarande sätt kan högst lokala förhållanden uppstå pga. utflöden av grund- eller ytvatten (diken, småbäckar mm.) vilket kan inverka både positivt och negativt på ett kräftbestånd.

Vid sidan om de direkta försurnings-effekterna på kräftans fysiologi, påverkar försurningen även den miljö kräftan lever i. Förändringen av predationstrycket från fisk är den faktor som visats påverka kräftan mest. I många vatten ökar abborrtätheten vid en måttlig försurningsskada, beroende på att konkurrensen med andra mer försurningskänsliga fiskarter minskar. Abborren är också känd som en av de vanligaste predatorerna på kräftan. Detta medför att under ett försurningsskede ökar predationstrycket på kräftan, samtidigt som den utsätts för direkta fysiologiska störningar.

### 3.1.3 Övergödning och förgiftning

I övergödda sjöar förekommer en kraftig sedimentation, orsakad av en hög växtplanktonproduktion. Sedimentationen leder till att skyddande hålrum på hårbotten blir otillgängliga för kräftor pga. igenfyllnad och syrgasbrist. Övergödda sjöar är oftast omgivna av jordbruksmark och där tillkommer ytterligare ett hot mot flodkräftan. Kräftor är nämligen mycket känsliga för olika typer av bekämpningsmedel, särskilt insektsgifter. Kräftan är nära besläktad med insekterna och således ytterst känslig

för insektsgifter. Kräftor kan vara upp till tio gånger känsligare för pesticider än vad fisk är. Även hantering av permitinbetade skogsplantor är en riskfaktor. Små mängder av bekämpningsmedel/insektsgifter som driver med vinden, dräneras till ytvatten eller vid rengöring av tankar och annan besprutningsutrustning kan på så sätt nå ut i vattendragen och orsaka mycket stora skador på en kräftpopulation.

Problem med hög näringsbelastning genom läckage från jordbruksmark, är oftast störst i södra Sveriges jordbruksområden.

### 3.1.4 Reglering av vattendrag

Flodkräftan förekommer främst i strandnära områden där det finns gott om sten som kan utgöra skydd. I flertalet sjöar förekommer sådana områden enbart inom ett begränsat djupintervall omfattande högst 2-3 m, och ofta är intervallet ännu mindre. Flodkräftan är därmed mycket känslig för vattenståndsförändringar, och onormala variationer kan få allvarliga konsekvenser. Säsongsreglering av vattenståndet och dygnsreglering omfattande 1 – 2 dm kan leda till allvarliga skador på beståndet.

Korttidsreglering av flödet i vattendrag kan medföra allvarliga skador på kräftbestånden, dels genom att vegetationen och den övriga bottenfaunan påverkas negativt, men också pga. av ökade problem med frysning eller underkylning av vattnet vintertid. Ingrepp som vägbyggen, uträtningar, rensning eller muddring kan också vara negativa då de förändrar bottenstrukturer och ge en uppslamning av partiklar i vattnet.

### 3.1.5 Grumling

Vid arbeten i vattendrag, avverkningar, utdikningar mm. medför detta till att mängden finfördelade partiklar ökar avsevärt i vattendraget. Gälblad

och rom blir täckta av mineralpartiklar vilket reducerar syrgasutbytet. Dessutom hämmas romsättning, genom att rommen får svårare att fästa på undersidan av honan. Förutom de direkta effekterna på kräftorna kan grumling orsaka förändringar av kräftornas biotoper vid sedimenteringen. Bohålor och lämpliga bottnar kan slammas igen och sedimentationen på växter kan orsaka en minskning av vegetationen och därmed födan.

### 3.2 Biotiska (biologiska) faktorer

Bland de täthetsberoende faktorerna är det i första hand parasiter (främst kräftpesten), fiske och predation från fisk och landlevande djur (mink) som bidragit till flodkräftans nuvarande utbredning och situation i Sverige.

#### 3.2.1 Predatorer på kräftor

Flodkräftan har ett flertal vatten- och landlevande fiender, varav några t ex. minken inte är naturliga för kräftan. Av de landlevande fienderna utgör minken (se nedan) en av de svåraste predatorerna. I fiskfaunan är det främst ål, abborre (>15 cm), gädda (>15 cm) och lake som anses vara de svåraste kräftpredatorerna. En av de största fienderna för kräftor är kräftan själv. Stora kräftor äter gärna små kräftor. Framförallt under och efter skalömsningen, då kräftans skal under 1-2 veckor är mjukt och kräftan därmed mycket sårbar.

Relationen mellan predator och kräfta är oftast balanserad så att både predator och kräftor förekommer. Abborren finns i ca 95 % av Sveriges sjöar och utgör den mest vanligt förekommande kräftpredatorn. Trots detta finns det många täta kräftbestånd i sjöar med täta abborrbestånd. Om balansen mellan predatorn och kräftan störs, t ex genom att de vattenkemiska omgivningarna förändras, eller att tätheten av endera arten förändras, kan detta leda till att predatorn får ett allt för stort övertag över



*Minkfälla intill damm.*

kräftan, vilket kan medföra att kräftbeståndet kraftigt reduceras.

Ålen hindras att naturligt vandra upp i de Värmländska/Dalsländska vattendragen genom åtskilliga vandringshinder. Ålutsättningar sker dock men dessa kan regleras genom administrativa beslut om inplantering.

Vilken roll predationen spelar för kräftbeståndets täthet bestäms inte bara av tätheten av predatorer. En mängd olika faktorer påverkar detta. Sålunda spelar tillgången till skydd, alternativa födoslag till predatorn mm. en avgörande roll. I vatten med gott om skydd i form av sten, håligheter, ris/kvistar eller vegetation har kräftorna större möjligheter att undkomma predatorerna. I vatten där kräftan har ont om skydd, kommer predationen att spela en större roll.

#### 3.2.2 Överfiskning

I många fall är kvarvarande flodkräftpopulationer hårt exploaterade. Ett alltför hårt fisketryck kan starkt reducera förekomsten av kräftor och återhämtningen hos en flodkräftpopulation efter överfiskning kan ta många år. Det statliga regelverket kring kräftors fisketid och minimått

upphörde 1993. Idag finns inget regelverk utan det är upp till respektive fiskrättsägare att avgöra hur och när fisket skall bedrivas. Det kan synas motsägelsefullt att lagstiftningen tillåter en hård exploatering av en art vars framtida existens är allvarligt hotad.

Sannolikt är det dock nästan omöjligt att helt utrota ett kräftbestånd genom ett alltför intensivt fiske, och kräftfisket utgör därför knappast ett direkt hot mot flodkräftan. Överfiskning kan dock indirekt utgöra ett hot mot flodkräftan, eftersom minskande fångster i ett vatten kan öka risken för illegal utsättning av signalkräfta. Kräftan blir könsmogen redan då den är 6-7 cm. Om endast kräftor över ett visst bestämt minimimått (t ex 9,5 cm) fiskas bort ur ett bestånd är risken för överfiskning minimal.

#### 3.2.3 Mink

Tillsammans med predatoriska fiskarter utgör mink den viktigaste predatorn på flodkräfta i Sverige och Norge. Där kräftor förekommer utgör de ofta en mycket viktig del av minkens föda, särskilt i näringsfattiga vatten, och det är huvudsakligen vuxna kräftor som konsumeras.

Genom att minken rör sig längs sjöar och vattendrag kan den också fungera som en vektor (bärare/spridare) för kräftpesten. Detta gäller speciellt vid ett akut pestutbrott när pesten stoppas vid ett vandringshinder. Eftersom det då finns en hög täthet av zoosporer nedströms vandringshindret är det stor risk att en mink som vandrar uppströms och kan föra med sig zoosporer i pälsen eller smittade kräftor förbi vandringshindret.

#### 3.2.4 Parasiter

Kräftdjur har generellt sett stor motståndskraft mot parasitangrepp, vilket beror på att deras försvarssystem är betydligt mer effektiva än våra egna. En kräfta kan t ex förlora alla

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

sina ben och nästan alla sina blodkroppar utan att behöva dö. Kräftor är ca en miljon gånger effektivare att känna igen och reagera på bakterier och svampar än vad däggdjur är.

En encellig inhemsk parasit på kräftor är *Psorospermium haeckeli* som är vanligt förekommande i våra nordiska flodkräftbestånd. *Psorospermium haeckeli* påträffas både i goda och dåliga flodkräftbestånd. Parasitens effekter på kräftor är dock omdiskuterad. Om ett flodkräftbestånd som är smittat med *Psorospermium haeckeli* stressas av olika faktorer, kan detta vara ödesdigert för kräftorna. Man kan jämföra med signalkräftor och pesten, så länge inte signalkräftor påverkas av stress kan inte pesten påverka signalkräftor i någon nämnvärd omfattning. Om de däremot blir påverkade av stress (t ex försurning, födobrist, predation mm.) och deras immunförsvar försämras av den stressrelaterade orsaken kan pesten döda signalkräftan.

*Psorospermium haeckeli* sprids troligen via kannibalism, sålunda är kräftungel fria från parasiten. Det kan vara värt att analysera sitt flodkräftbestånd med avseende på *Psorospermium haeckeli* om problemet med ett svagt kräftbestånd förekommer. Av säkerhetsskäl bör inte utsättningskräftor vara bärare av parasiten.

## 4. Flodkräftans biologi

### 4.1 Könsmognad

Flodkräftan blir könsmogen vid 6-8 cm längd vilket motsvarar en ålder av 3-7 år. Efter det att könsmognad inträtt parar sig som regel hanarna varje år. Under gynnsamma förhållanden (god näringstillgång och temperaturförhållande) kan de flesta honorna producera rom varje år, men det är vanligt att en del av honorna står över parningen och parar sig vartannat eller t om. vart tredje år. I södra Sverige visade en undersökning att antalet könsmogna honor som parade sig varierade från 53 % – 97 % i olika vattendrag.

### 4.2 Parning

Parningstiden pågår under tiden september - november och styrs av sjunkande vattentemperatur. När vattentemperaturen når ca 12°C påbörjas parningen. Vid parning placerar hannen spermiekapslar i närheten av honans könsöppningar. Befruktning sker när honan lägger rommen. Befruktningen (romsättning) kan ske direkt efter parningen till ca 3 veckor efter parningen. Honan bär sedan rommen under stjärten ända fram tills kläckningen. Beroende på temperaturen, inträffar den från midsommar fram tills mitten av juli.

### 4.3 Tillväxt

Tillväxten sker genom skalömsningar

och tillväxthastigheten bestäms främst hur många gånger kräftan hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. Beroende på väderleksförhållandena sker kontinuerliga skalbyten hos kräftor av olika storlekar under perioden maj och fram till början av september. Ju varmare försommaren är, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under tillväxtsäsongen. Under gynnsamma förhållanden kan ynglen första sommaren ömsa skal upp till 7 gånger och ha en längd av 2-3 cm i slutet av tillväxtsäsongen. Könsmogna flodkräftor ömsar skal vanligen 1-2 gånger per sommar, vid varje skalbyte växer könsmogna kräftor mellan 2 och 8 mm. Små kräftor kan ömsa skal vid så låga temperaturer som 5°C och könsmogna kräftor kan ömsa skal redan vid 9 – 11°C, medan optimala temperaturer för skalbyte är 17- 20°C.

### 4.4 Aktivitet och vandringar

Kräftan är nattaktiv och aktiviteten är temperaturberoende. Den är relativt stationär, men kan företa vandringar. Om sommaren uppehåller sig kräftan ovanför språngskiktet, dvs. på grundare partier där vattnet är varmare. Speciellt honor med rom är koncentrerade till strandzonen på våren och försommaren, för att utnyttja det varmare vattnet. Under hösten när sjön cirkulerar (vattnet har samma temperatur vid ytan som vid botten) fördelar sig kräftorna åter jämnt på olika djup.



Foto: Länsstyrelsen


## 4.5 Föda

Flodkräftan är i alla stadier omnivor, dvs. djur och växter samt delvis nedbrutet organiskt material ingår i födan. Andelen växter och djur i födan varierar genom åren och mellan olika storleksgrupper. Innslaget av djur i födan är störst under de första levnadsåren. När det gäller växtmaterial föredrar kräftor påväxtalger och högre vattenväxter, men äter även frön, nedfallna löv, rötter och övrig dött organiskt material som dessutom är omgivna av en rik bakterieflo-  
 ra. Den viktigaste djurfödan består av insektslarver, snäckor och små kräftdjur. Kräftorna är dessutom kanibaler.

## 5. Kräftpest

### 5.1 Kräftpest – en svamp

Ett av de största hoten mot flodkräftan är kräftpesten (*Aphanomyces astaci*). Kräftpesten är en vattenlevande parasitsvamp som härstammar från Amerika och som spridits till Europa via handel med kräftor. Kräftpestsampen tillhör ett ganska stort



Astacusprojektets logga

släkte vattensvampar, som omfattar drygt 20 olika arter. Kräftpestsampen är en specifik parasit på en speciell värdorganism (kräftor). Det betyder att de i naturen inte överlever i frånvaro av sin värd utan dör ut om värden försvinner. Kräftpestsampen saknar sexuella stadier, vilket innebär att strukturer för långvarig överlevnad utanför värden saknas. Kräftpestsampen är hänvisad till att bilda förökningskroppar på asexuell (könlös) väg. Dessa kroppar kallas zoosporer och sprider pesten vidare från en infekterad kräfta till en oinfekterad. Zoosporerna är mycket kortlivade och överlever endast någon vecka

(1-6 dagar) om de inte hittar en ny kräfta. När väl zoosporer når en kräfta fäster de på skalet och börjar växa igenom skalet och angriper vävnaderna under skalet. Inom loppet av 1 - 2 veckor avlider kräftan och svampen i den döende/döda kräftan sprider nya zoosporer som infekterar nya friska flodkräftor. Kräftor som dött i kräftpest smittar i minst fem dagar, om kräftan ligger i 10°C. Förloppet för sjukdomen (spridningshastighet och sporens livslängd) påverkas starkt av vattentemperaturen och antalet zoosporer.

### 5.2 Historik om kräftpesten

I Europa fanns ingen kräftpest före 1860 då plötsligt en epidemi startade i Po i norra Italien, när smittade amerikanska kräftor kom till Europa med båt från Amerika.

I Europa spreds kräftpesten snabbt åt alla håll och nådde Finland 1893. Importen av flodkräftor från Finland till Sverige under denna tid var omfattande, ca 1,9 miljoner flodkräftor importerades till Sverige 1906. I Sverige oroades man av pestens ut-




Illustration: Per Brunström, Hushållningssällskapet

veckling i Finland och ett importförbud infördes därför 1907. Tyvärr kom förbudet några veckor för sent och över en miljon kräftor hade redan hunnits importerats. Vid ankomsten dumpades "dåliga" och självdöda kräftor i Mälaren utanför Stockholm, och därmed fanns kräftpest i Svenskt vatten. Mälarens kräftor slogs snabbt ut och därefter spreds pesten 1908 till Hjälmarens, Sveriges kräftrikaste sjö. Här togs före pestens ankomst 200 000 tjog kräftor per år.

Pesten höll sig snällt i Mälaren och dess tillrinningsområde ända till 1928 då den plötsligt dök upp i Västergötland. I början av 1930-talet drabbades också det kräftrika Småland för första gången. Intressant är att pesten alltså höll sig i Mälaronrådet tills bilen blev ett vanligt forskaffningsmedel, dvs. omkring 1930. Det är ingen tvekan om att det framför allt är människor som orsakar pestens spridning.

### 5.3 Myter och felaktiga påståenden

Det stora kräftintresset i Sverige medförde att röster höjdes för att hitta en kräfta med syfte att ersätta flodkräftan i de vatten som drabbats av kräftpest. Genom den stora betydelse som kräftfisket har haft och har i Sverige, både ekonomiskt och socialt, tilldrog sig introduktionen av signalkräftan till landet ett enormt intresse. Detta intresse upprätthölls genom ett stort antal mer eller mindre okritiska rapporter och tidningsartiklar om signalkräftans tillväxt- och produktionspotential, samtidigt som information om konsekvenserna av signalkräftintroduktionen i eller närheten av vatten med flodkräfta inte nådde ut till allmänheten. Detta gav upphov till en mängd myter som florerat runt bland allmänheten och som bidragit till illegala utplanteringar av signalkräftor i tron att det inte går att bevara flodkräftor eller återinplantera flodkräftan efter ett pestutbrott. Följande är exempel på några av de myter om signalkräftan och

kräftpest som ännu idag är förankrade hos en stor del av allmänheten:

1. Att plantera ut flodkräfta igen är i princip hopplöst.
2. Har pesten en gång slagit till i en sjö är det omöjligt att få tillbaka flodkräftan.
3. Kräftpesten lever kvar i botten på sjön i många år.
4. Signalkräftan växer tre gånger så fort som flodkräftan.
5. Signalkräftan är immun mot kräftpest och drabbas aldrig av sjukdomen.
6. Planterar man ut signalkräfta lyckas man alltid och kan börja fiska redan efter 2-3 år.
7. Om man glesar bland de små kräftorna så får man bättre tillväxt och undviker "dvärgbestånd".
8. Flodkräftan hade ändå utrotats oavsett signalkräftan.
9. Man har inte funnit några negativa effekter av signalkräftan.

Samtliga dessa påståenden är bevisligen felaktiga. Men har legat till grund för signalkräftans oförtjänta popularitet. Påståendena har legat till grund för de omfattande illegala utsättningar som gjorts över hela Sverige.

### 5.3 Kräftpestens spridning i samma vattensystem

Zoosporerna har dålig simförmåga och de sprider sig därför lättare nedströms

än motströms. Detta leder till att kräftpesten snabbt kan infektera kräftbestånd som finns nedströms i vattensystemet. Zoosporerna kan inte självmant sprida sig motströms. Motströms sprids pesten t ex. med smittade kräftor som vandrar motströms, att människor eller djur flyttar smittade kräftor eller redskap. Hur snabbt pesten sprids motströms varierar, men det finns dokumenterade fall på att den spridit sig med hastigheten 3 km/år vid ett vattendrag och ca 1 km motströms under 1 – 1,5 sommarmånader vid ett annat vattendrag. Det går betydligt snabbare om människor och djur är inblandade i smittspridningen.

Hur snabbt ett flodkräftbestånd slås ut kan variera mycket beroende på vattensystemets karaktär och tätheten på flodkräftbeståndet. Ett bra flodkräftbestånd som utsätts för pesten kan dödas på några veckor, pga. pestsporerna enkelt påträffar friska flodkräftor. När samtliga flodkräftor slagits ut försvinner kräftpestsvampen snabbt pga. brist på näringssubstrat. Kräftpestsvampen tar i så fall död på sig själv. Man brukar säga att 30 dagar efter att sista flodkräftan dött ut, är vattensystemet fritt från kräftpest.

I komplexa vattensystem och motströms i rinnande vatten, går spridning-



Illegalt utplanterad signalkräfta i Fjällsjön, Eda kommun.

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

en långsammare. Kräftpestsvampen tycks därför "leva kvar". I själva verket pågår också här samma förlopp dvs. svampen infekterar och dödar kräftor, men mycket långsammare än i täta och samlade flodkräftbestånd.

### 5.5 Kräftpestens spridning mellan olika vattensystem

Det finns mycket lite belagt om hur pesten sprids från ett vattensystem till ett annat, och även hur den sprids inom ett vattensystem. Helt klart är dock att en smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och därigenom smittar andra kräftor. Detta innebär att den absolut viktigaste smittkällan är signalkräfter (*Pacifastacus leniusculus*) som är bärare av pestsvampen i sitt skal samt pestdrabbade flodkräftor eller delar därav. Troligen orsakades de flesta tidigare pestutbrott, innan signalkräftans inträde i Sverige, av att pestdöda, smittade flodkräftor eller smittade kräftdelar förflyttades av framförallt människor men även av fåglar och däggdjur till andra vatten. Människan är och har varit den effektivaste smittspridaren genom att förflytta pestsmittade kräftor från ett vatten till ett annat. Idag är illegal utplantering av signalkräfter den absolut vik-

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet



Båtramp vid Nössemark, Stora Le i Dals-Eds kommun. En möjlig källa för spridning av kräftpest mellan olika vattensystem.

tigaste orsaken till spridning av kräftpest.

För att en flodkräfta skall bli smittad av kräftpest krävs en viss koncentration av zoosporer i vattnet. Med tanke på utspädningen, är det mindre troligt att t ex fiskredskap i sig kan sprida pesten från ett vatten till ett annat, under förutsättning att inga kräftrester medföljer från redskapet. Möjligheten att båtar som transporteras landvägen mellan olika vatten skall sprida pest är därmed också liten. Sporerens korta livslängd och den begränsande mängden vatten som överförs gör att man vågar dra den slutsatsen.

Om däremot kräftor eller kräftrester medföljer kan vidare spridning ske.

Om stora vattenvolymer tas från ett vatten och sedan sprids till ett annat föreligger en uppenbar risk att kräftpest sprids. Vid fiskutsättningar transporteras t ex stora mängder vatten, som vanligtvis tippas ut vid strandkanten. Ett akut pestutbrott uppströms fiskodlingen kan mycket väl medföra att pesten sprids till utsättningsplatsen genom att zoosporer följer med i vattentanken.

Vid förflyttning av fiskredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar följa med och dessutom kan kräftfiskeredskap som kommit i kontakt med smittade kräftor föra smittan vidare om de använts i andra vatten utan föregående desinficering eller uttorkning. Sporer kan även spridas genom att de fäster i slemskiktet hos fisk eller att fisk ätit smittade kräftor och via avföringen sprids sporer vidare.



Signalkräfta som bärsynliga tecken på kräftpest.

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

### 5.6 Signalkräfter sprider kräftpest

Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den introducerade signalkräftan. Den främsta anledningen till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att kräftpestsvampen förekommer som en parasit hos i stort

sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvampen har det liksom hos alla andra amerikanska kräftarter som undersökts, utvecklats en normal parasit/värd – förhållande. Dvs. parasiten dödar inte sin värd annat än i undantagstillstånd, när immunförsvaret hos signalkräftan försvagats. Signalkräftor har sålunda ett starkt försvar mot kräftpesten. När svampen tränger in i skalet på en signalkräfta sker en motreaktion. Kräftans immunförsvaret har möjlighet att melanisera (kapsla in) svampens hyfer i skalet, vilket förhindrar svampen att växa in i kräftans vävnader. Kräftpesten ligger då latent hos individen och kan angripa kräftan om immunförsvaret blir försvagat, t ex genom skalskador, stress eller till följd av andra parasiter. En signalkräfta som bär på kräftpesten, utvecklar synliga svarta fläckar, som oftast finns i spetsarna på avbrutna extremiteter eller kring andra skalskador där svampen försökt tränga in. Dessa fläckar syns inte alltid direkt efter ett skalbyte utan utvecklas successivt. Fläckarna upptäcks lättast på våren, före säsongens första skalbyte.

Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av signalkräftor i ett vatten innebär därför att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet. Därmed omöjliggörs återetablering av flodkräfta i hela vattenområdet för överskådlig framtid.

Eftersom signalkräftor sedan 1994 inte får planteras ut i vattenområden där arten idag saknas är det framför allt de illegala utsättningar av signalkräftor som är det största hotet mot flodkräftan idag.

### 5.7 Illegala utsättningar av signalkräftor – största hotet mot flodkräftan

Dåvarande Fiskeristyrelsen gav 1969 tillstånd till omfattande utplanteringar, efter att haft en försöksperiod med signalkräftor i ett mindre antal sjöar. I takt med att tillgången till vildfångade signalkräftor ökade, ökade också antalet illegala utsättningar. En stor del, kanske huvuddelen, av de kräftpestutbrott som inträffat i vatten med flodkräfta sedan början av 80-talet har troligen orsakats av illegala utsättningar av signalkräfta. Efter att tillstånd gavs till utplantering av signalkräftor ökade även kräftpestutbrotten. I Stockholms län drabbades 35-40 sjöar av kräftpest under tidsperioden 1907 - 1980, medan ca 90 olika sjöar blev drabbade av kräftpest under tidsperioden 1981- 2000.

Problemet med illegal utplantering av signalkräfta är mycket påfallande. Via rykten och konkreta fångster med signalkräftor har Astacus-projektet fått en uppfattning om allvarlig situationen är i Värmland och Dalsland. I Dalsland har man 2004 ca 8 kända lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, varav de två största sorgebarnen är det stora sjösystemet med

Stora Le och Lelång. I Värmland finns uppskattningsvis 40 – 45 lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, med tyngdpunkten på östra Värmland. Mörkertalet är förstås stort. Dessa signalkräftor befinner sig i avrinningsområden som fortfarande hyser flodkräftbestånd och utgör därmed ett mycket stort hot mot dessa.

### 5.8 Lagstiftning för att förhindra spridning av kräftpest och signalkräftor

För att minska risken för spridning av kräftpest och andra sjukdomar är det enligt lagstiftningen i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerieringen (SFS 1994:1716) samt Fiskeriverkets föreskrifter om odling, utplantering och flyttning av fisk (FIFS 2001:3) förbjudet att :

- \* Sätta ut eller flytta fisk och kräftor från ett vatten till ett annat utan tillstånd från Länsstyrelsen
- \* Flytta kräftfiskeriedskap mellan olika vatten utan att desinficera dem
- \* Förvara, beta med eller kasta kräftor eller delar av kräftor i ett annat vatten än där de fångats
- \* Rengöra eller kasta emballage som använts för förvaring av kräftor i ett annat vatten.

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet



*Försök att stoppa en akut kräftpestframryckning vid utloppet ur Teakensjön med hjälp av släckt kalk.*

För att förhindra vidare spridning av kräftpest får länsstyrelsen vid ett pestutbrott i ett vattendrag besluta att ett visst område skall anses kräftpestsmittat. Inom ett sådant område kan gälla fångstförbud, förbud att saluhålla, sälja, köpa eller transportera kräftor eller förbud att använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats.

### 5.9 Praktiska råd till hur du/ni kan förhindra spridning av kräftpest till ert flodkräftvatten

Kräftpesten medför 100 % dödlighet för flodkräfta och smittade individer dör oftast inom några veckor. Sjukdomen sprids från ett vatten till ett annat främst genom signalkräftor, som alltid är bärare av sjukdomen, och smittade flodkräftor. Smittan sprids också genom att sporer följer med i vatten eller i blöta/fuktiga föremål som varit i kontakt med vatten innehållande sporer och transporteras till ett annat vatten. Ju större mängd vatten som överförs desto större smittrisk. Utanför kräftan lever sporen maximalt någon vecka (1-6 dygn) i vatten. Sporena överlever inte uttorkning samt höga temperaturer (>26°C).

Genom att känna till och tillämpa följande råd ökar ni möjligheterna till att behålla och nyttja flodkräftan i era vatten i framtiden:

\* Desinficering eller torkning till absolut torrhet av fiskredskap, båtar, kanoter, vadarstövlar, badkläder och annan utrustning innan de flyttas mellan olika sjöar/vattendrag

\* Använd betesfisk från samma vatten som du fiskar i eller djupfrys betet i minst ett dygn innan användning

\* Anmäl till Länsstyrelsen och kräftansvarige i vfvo om du fångar eller observerar kräftor som du misstänker är sjuka

\* Var mycket noga vid utplantering av fisk för att säkerställa att det inte förekommer signalkräftor i de vatten som fiskodlingen bedrivs i. Om misstankar finns att det förekommer signalkräftor vid fiskodlingen bör utplanteringen av fisk uppskjutas eller byt fiskleverantör.

### 5.10 Att tänka på vid utsättning av fisk – för att förhindra spridning av kräftpest

\* Bada fisken i saltlösning.

\* Se till att absolut inget vatten från

odlingen följer med i transporten (ersätt med kranvatten).

\* Se till att redskap och transportkärl har desinficerats innan de används

\* Se till att fisken inte haft möjlighet att äta kräftor minst tre dagar före transport.

### 5.10 För att säkerställa dig att du inte medverkar till spridning av kräftpesten, använd en av följande metoder för desinficering som du anser är enklast att använda dig av:

\* Torkning till fullständig torrhet t ex. i bastu minst 70°C i minst fem timmar (stora föremål) eller minst en timme (små föremål) genom långvarig soltorkning eller lufttorkning (flera dygn)

\* Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit: 1 del vatten). Fångstredskap (kräftmjärdar mm.) bör hållas nedsänkta i minst 20 min.

\* Frysning -10°C under minst ett dygn.

\* Kokning under lock minst 5 min, föremålet skall vara nedsänkt i vatten.

\* Tvättning med högtryckstvätt med minst 80°C vatten eller ånga.

\* Båtar och kanoter duschas med t-röd med duschspruta efter det att allt vatten är urtömt och avtorkat.



Vandringshinder i tillflöde till Stora Le, Strömviken i Dals-Eds kommun.

Foto: Tomas Janson, Hushållningsällskapet



Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

*Spridning av släckt kal i Teakersälven för att skapa en kräftfri zon*

### 5.11 Tänkbara metoder för att förhindra kräftpestens spridning i ett vattendrag

Dessa metoder för att hindra kräftpestens spridning bygger på att skapa en kräftfri zon i ett vattendrag. Pesten kan bara överleva och sprida sig med levande eller nyss döda smittade kräftor. Den kan därför inte sprida sig uppströms i ett vattendrag utan att kräftor förflyttar sig eller förflyttas uppströms. Visserligen finns en teoretisk risk att levande sporer kan spridas med fisk, men sannolikheten är liten.

#### **Vandringshinder**

Vandringshinder (dammar, slussar, vattenfall mm.) kan stoppa kräftpestens spridning uppströms. Det är därför viktigt att överväga om åtgärder att skapa fiskpassager (omlöp, fisktrappor) förbi vandringshinder, kan leda till att spridningen av kräftpest underlättas.

#### **Kalkning**

Kalkning kan under vissa omständigheter användas för att förhindra spridning av kräftpest i ett vattendrag. Kalken som skall användas är bränd (CaO) eller släckt (Ca(OH)<sub>2</sub>) kalk för att ge ett tillräckligt högt pH-värde för att vara säker på att en kräftfri zon skapas. Kalkningen skall utföras så

att pH-värdet på minst 10,5 uppnås under ett dygn. Så höga pH-värden ger upphov till skador på övrigt liv där åtgärden skall utföras. Metoden kan därför endast användas för att tillfälligt skapa en kräftfri zon eller slå ut illegalt utplanterade signalkräftor.

#### **Elektriska spärrar**

Med el-spärr kan man skapa en kräftfri zon även i ett större vattendrag. Man placerar strömförande wirar tvärs över vattendraget på två platser med ett avstånd av ca 100 m från varandra. Både kräftor och fisk hindras från att passera zonen mellan wirarna. En el-spärr kan användas betydligt längre än en kalkspärr. Metoden kräver tillgång till elström samt avspärrning av området där el-spärrarna finns.

#### **Nedsmittning**

Metoden bygger på att en kräftfri zon skapas i ett vattendrag som hotas av kräftpest, genom att sprida ut smittade kräftor vid de områden man vill skapa en kräftfri zon t ex nedströms ett vandringshinder.

Oavsett vilka bekämpningsmetoder man väljer bör man, om möjligheten finns, fiska ännu osmittade kräftor från området och hålla dem på betryggande sätt, t ex i dammar. Dessa djur

kan sedermera användas som återinplantering efter pestens försvinnande.

Det är mycket viktigt att rådgöra med länets fiskerikonsulent innan någon av ovanstående metoder prövas. Mynigheternas tillstånd för att vidta åtgärderna krävs.

### 5.13 Sammanfattning av kräftpestspridning

Pesten är en svampsjukdom som medför 100 % dödlighet för flodkräftor och smittade individer dör oftast inom några veckor. Pesten kan spridas med:

- \* Vatten (som innehåller pestsporer)
- \* Smittade flodkräftor eller kräftdelar
- \* Signalkräftor
- \* Fisk
- \* Fåglar
- \* Däggdjur

#### **Fisk**

o Avföring från fisk som ätit infekterande kräftor smittar upp till två dagar  
o Sporer kan leva i slemmet på fisk någon dag

#### **Fågel (Däggdjur)**

o Ingen smitta via avföring från fågel. Beror på hög kroppstemperatur (35-37°C) i matspjälkningsorganen jämfört med fisk

o Kan transportera smittade kräftor och kan teoretiskt sett ha med sig några droppar vatten med sporer i päls och fjädrar. Pestspridning uppströms förbi vandringshinder, orsakas troligtvis av minkar (fåglar) som flyttar pestsmittade kräftor

### 6. Kräftvårdande åtgärder

För att framgångsrikt kunna bevara och förbättra förutsättningarna för flodkräftan krävs att hoten i respektive vatten klarläggs innan man kan skydda sig mot hoten och att försöka klarlägga orsakerna till varför ett bestånd ser ut som det gör idag. Man måste veta att ett vårdbehov föreligger



Foto: Trond Taugbol, NINA

*Konstgjorda gömslen som tagits i bruk av kräftor. I första hand bör naturliga material som smälter in i miljön användas.*

ger samt vilka åtgärder som ger bästa effekt. När de vårdande åtgärderna är genomförda måste man kunna mäta effekten (provfiske), i biologiska termer.

### 6.1 Kalkning

För att rädda eller bevara ett kräftbestånd i försurningspåverkade vatten är det nödvändig att neutralisera det sura vattnet genom kalkning till ett stabilt pH-värde över 6,0. Länsstyrelserna ansvarar för den regionala åtgärdsstrategin och effektuppföljningen samt beviljar statsbidrag till huvudmannen (ofta kommuner) om kalkningen.

För att kalkningsåtgärderna skall ge resultat i form av ökade kräftbestånd är det väsentligt att de utförs på ett sådant sätt att de områden där reproduktionen av kräftor sker nås av åtgärden. Detta innebär att den översta delen av sjöns strandzon måste nås av kalkningsinsatsen.

Viktigt är att även kalka mindre tillflöden (skogsbackar) som mynnar i sjön eller vattendraget som kan medföra att högst lokala förhållanden kan uppstå pga. utflöden av grund- eller ytvatten (diken, småbackar mm.). De mindre tillflödena kan inverka både

positivt och negativt på ett kräftbestånd. Som en konsekvens av ovanstående, ges också goda möjligheter att med olika åtgärder skapa lokalt goda förutsättningar i ett övrigt mindre lämpligt område, bl. a genom direkta kalkningsinsatser.

Genom att känna sitt kräftvatten om var förekomsten av kräftorna är som störst respektive sämst, kan man via sin lokala kännedom bedöma om det varierande kräftbeståndet är orsakat av försurningsskador. Därmed kan man tillsammans med länsstyrelsen komplettera de kalkningsåtgärder som eventuellt pågår till ytterligare punktinsatser.

### 6.2 Minkbekämpning

Om man vill gynna ett kräftbestånd, är minkbekämpning mycket betydelsefullt. Även om det för tillfället inte förekommer några synliga tecken på att minken finns inom området kan man med stor sannolikhet anta att mink periodvis vistas inom området och att det snabbt kan ske en permanent etablering av mink om ett kräftbestånd börjar byggas upp. Det gäller att från första början och framgent bekämpa minken med alla tillbuds stående medel. Med vetskap om att **en** mink under en natt vid ett naturligt kräftvatten dödade ca 300 kräf-

tor, förstår man lätt vidden av detta rovdjurs betydelse. Vålgjorda fällor, rätt skötta och riktigt placerade, tillsammans med god jakt- och viltkunskap är de bästa motmedlen mot mink.

### 6.3 Biotopförbättrande åtgärder

Som alltid gäller att tillgången på föda och gömslen är av avgörande betydelse för hur bra ett kräftbestånd är eller kan bli. Mycket grovt brukar 10 kräftor av olika storlekar/m<sup>2</sup> räknas som ett tätt bestånd. Av dessa 10 kräftor kanske endast en eller ibland färre kan fiskas för konsumtion per år. Avkastningen av en ordinär till bra kräftsjö bör vara 5-50 kg per ha och år vilket motsvarar ca 165 – 1650 stycken kräftor per ha och år vid en storlek av ca 10 cm. Oavsett vilka predatorer som förekommer i vattnet och i vilken omfattning de finns i, är tillgången på skydd/gömslen och bon avgörande hur bra kräftorna kan värja sig mot angreppen.

Oftast varierar tillgången på gömslen i en sjö. På grus-, ler- och stenbottnar finns det oftast naturliga gömslen, medan andra delar av en sjö kan bestå av lösbottnar som inte ger några naturliga skydd. Det är framförallt i sådana delar av en sjö eller vattendrag som historiskt haft ett svagt kräftbestånd som biotopförbättrande åtgärder kan utföras för att höja produktionen och avkastningen i hela sjön.

Det är viktigt att det finns bon för kräftor i alla storlekar, att de täcker hela kräftan samt att gömslen finns på olika vattendjup från strandkanten och ut till ca 5 m djup. Kräftor kan utnyttja olika djup vid olika årstider. Under varma somrar när vattentemperaturen når 24-25°C i strandnära områden blir kräftorna stressade. Ju högre temperaturen är, desto aktivare blir kräftorna, samtidigt som vattnets syrebärande förmåga minskar. Kräftorna söker sig då normalt mot djupare och svalare vatten med högre syrgasvärden. Kräftor utnyttjar

djupare partier även under vinterhalvåret. Vid isläggning rör sig kräftorna som finns i strandnära områden mot djupare vatten för att sedan vandra tillbaka på våren när isen släpper.

Innan man påbörjar biotopvårdande åtgärder genom utläggning av olika bomaterial bör man göra en inventering av vilka områden i sjön/vattendraget som är i behov av en sådan åtgärd och att det faktiskt finns ett behov av åtgärden. En kartläggning över var de bästa respektive sämsta kräftförande lokalerna i respektive sjö/vattendrag fanns innan kräftbeståndet försvann/minskade, ger en bra vägledning för biotopförbättrande insatser.

Utanför sina bohålor är kräftorna känsliga mot predation. Vid födosök och under parningstiden exponeras kräftorna för predatorer. Det är då viktigt att det finns gott om gömsle/skydd i närheten av bohålorna. Beroende på födotillgången kan avståndet från bohålan till där kräftan hittar sin föda variera. Därför är det lämpligt att mellan bohålorna och där födosöket sker, lägga ut ridåer med risknippen och grenar mm. som kräftorna kan gömma sig under.

Exempel på biotopvårdsåtgärder för att öka tillgången på bon och skydd/gömslen:

- \* Utläggning av stockar och större grenar

- \* Tegelpannor och stenar som läggs i högar/strängar

- \* Längs stränderna kan man lägga ut sten från omgivande landområden.

- \* För att skapa utrymmen under och mellan stenarna, kan man med hjälp av ett järnspett och vadarbyxor lyfta på redan befintliga stenar i strandzonen som ligger delvis nedsjunkna i botten.

- \* Risknippen, risvasar mm. som ligger utspridda på botten vilket kräftor kan söka skydd under vid födosök och parning.

För att minska kannibalism mellan stora och små kräftor kan man vid utläggning av gömslen sortera ut gömslena efter storleksordning. T ex kan en utlagd gömslehög bestå av sönderslagna tegelpannor som innehåller små gömslen och som därmed riktar sig mot små kräftor. I takt med att kräftorna växer måste de söka upp större gömslen, vilket kan vara ett närbelägen utlagd gömslehög som har stora gömslen dvs. hela tegelpannor. Kräftorna förflyttar sig därmed mellan de olika gömslena beroende på vilket storlek kräftorna har.

Vid utförandet av biotopförbättrade åtgärder bör man vara aktsam med att åtgärden ser bra ut och smälter in i omgivningen (t ex storleken på sterna, så de stämmer med det befintliga.).

I en norsk sjö med ett kräftbestånd gjordes en undersökning med omfattande utläggning av naturliga gömslen i en del av sjön som hyste ett mycket svagt kräftbestånd. Sju år senare och ca 1000 ton sten hade avkastningen ökat till uppskattningsvis 20 kg/ha. Man använde sig av natursten i varierande storlek från ett grustag som tippades vintertid på isen från lastbilar. Stenen blev lagda i långsgående åsar på isen i den form och i den areal de önskade att det skulle täcka. Vattendjupet på utläggningssområdet var mellan 2-4 m. Höjden på stenrösen var 1-1,5 m så att det skulle bli helt täckt av vatten, även vid ett lågt vattenstånd.

Ett annat norskt försök med konstgjorda gömslen som bestod av ihopsatta dräneringsrörbitar och keramikoner gav lika goda effekter. Tre ca 20 m breda och 50 m långa sektorer från land och utöver anlades, djupet längst ut i vardera sektor varierade mellan 2 - 4 m. I varje sektor placerades ca 1800 konstgjorda gömslen. De biotopvårdande åtgärderna medförde en ökning av avkastningen från mindre än 5 kg/ha till 20 kg/ha på tio år.

Biotopvård behöver inte enbart vara iläggande av ytterligare skydd/gömslen, utan man kan se till att vattnet inte växer igen med ökad slampålagring som följd. En viss vassbekämpning kan vara motiverad, under vegetationen finns ofta hårda bottenar. Men där vassen upphör ut mot öppet vatten kan det ibland förekomma en brant kant. Som riktmärke brukar man kunna säga att så länge bottenen sluttar är också bottenen hård, och därmed bra för kräftor. Utanför vasskanter kan man med fördel utföra biotopvård



Foto: Länsstyrelsen i Värmland

*Ett vattendrag som varit påverkat av flottledsrensning som blivit biotopvårdat i syfte att öka det lokala öringbeståndet. Stenläggningar har skapat bon och gömslen även för flodkräftor. Lagg märke till den goda tillgången av strandvegetation.*

dande åtgärder, vid födosök vandrar kräftorna från bohålor in till vasskanten där det förekommer gott om föda både, i form av vegetation samt ett rikt insektsliv. Ynglen har dessutom gott om gömslen bland vegetationen.

Kräftor gynnas av övrig fiskevård som utförs i ett rinnande vatten, i syfte att förbättra förutsättningarna för t ex. öring. I rinnande vatten är det även viktigt att de utlagda bona är stabila eller utplacerade på så sätt att de inte blir flyttade under höga vattenflöden.

#### 6.4 Stödutfodring

En faktor som påverkar kräftbestånden och avkastningen är tillgången på föda. Det kan i många fall vara födobrist som hämmar beståndsutvecklingen i vissa kräftförande vatten, framförallt i näringsfattiga vatten.

Det har visat sig att näringsrika sjöar med god näringstillgång inte har fler kräftor jämfört i näringsfattigare sjöar. Däremot är andelen större kräftor högre i näringsrikare sjöar, detta förklaras med att det finns mer pro-

teinrik föda i form av ett rikare insektsliv i näringsrika sjöar. Proteinrik (insekter, fisk, fiskrens mm.) föda är mycket viktigt inför skalbyten och tillväxten.

För att säkerställa en långsiktig god födotillgång är det viktigt att de omgivande markerna (buskar, träd, sly mm.) runt vattendragen tillgodoser dem med kontinuerligt nedfall av organsikt material. Därför är det mycket viktigt att man sparar trädriddar längs med och runt sjöar och vattendrag vid avverkning. Nedfall av landvegetation (träd, kvistar, grenar, löv mm.) är inte enbart en födokälla för kräftor utan det gynnar dessutom det övriga insektslivet i vattnet. Dessutom har grenar och kvistar en viktig funktion som substrat för påväxtalger som är en viktig födokälla för kräftor.

I framförallt i näringsfattiga vatten kan man lokalt öka tillgången på föda för kräftorna, med hjälp av stödutfodring. Stödutfodring kan ske med t ex. groddad havre (vid utfodring av spannmål är det viktigt att spannmålet groddas först, annars kan inte kräftorna tillgodose sig stärkelsen), allöv, hö, kokt potatis, kokt ris, kokta ma-

karoner, iläggande av risvasar, kvistar, sly av lövträd, inplantering av växter (t ex. Nitella) samt fisk och fiskrens. I potatisen är det potatisskalet som innehåller mest näring, koka potatisskalen några minuter för att omvandla stärkelsen till olika sockerarter och som kommer kräftorna tillgodo.

Man kan börja stödutfodringen i maj. I september bör utfodring av proteinrik föda upphöra pga. att om de får för mycket proteinrik föda kan kräftorna lägga ner mer energi på tillväxt istället för att bli parningsmogna och reproducera sig. Det är svårt att veta hur mycket man skall stödutfodra, man får helt enkelt ha koll på hur mycket av den utlagda maten som blir uppäten och anpassa givorna därefter. Man får inte överdriva givorna så att man skämmer vattnet, framförallt vid varmt väder.

I rinnande vatten kan man öka födotillgången genom att förankra risknippen för uppsamling av förbiflytande organiskt material (löv, kvistar mm.) samt se till att det bevaras en trädzon längs strandkanterna som därmed regelbundet avger löv, kvistar mm. vilket ramlar ned i vattnet och kommer kräftorna och övrigt insektsliv tillgodo.

Genom att stödutfodra kräftorna kan man även öka andelen parningsmogna honor, vilket ökar nästkommande års årsproduktion av yngel. Dessutom får honor som är i bra kondition en bättre romkvalité med en bättre överlevnad på ynglen.

Stödutfodring ger en del extraarbete och att utfodra en hel sjö är inte genomfört. Däremot kan man lokalt utfodra kräftorna av dem som är intresserade och som bor eller ofta uppehåller sig runt sjön, t ex. vid båtplatser, sommarbostäder mm.. Den lokala stödutfodringsåtgärden som utförs kommer de fiskrättsägare till godo som utnyttjar lokalerna till sitt kräftfiske och på sikt hela sjön/vattendraget.



Exempel på hur en kräftsump ser ut.

Foto: Tord Näslund, Hushållningsällskapet

## 6.5 Utplantering

Vid svaga bestånd eller bestånd som slagits ut pga. av försurning eller kräftpest är det fullt möjligt att återintroducera flodkräftor om orsaken till den tidigare tillbakagången är känd och åtgärdad. All utplantering och flyttning av kräftor från ett vattendrag till ett annat kräver tillstånd från länsstyrelsen. Att sprida kräftor inom samma vatten är dock tillåtet utan tillstånd, dock krävs tillstånd vid flyttning förbi ett vandringshinder inom samma vattendrag.

För att säkerställa och bevara ett friskt kräftbestånd är det viktigt att kräftor för utsättning inköps från en hälsokontrollerad odling eller hälsokontrollerat vatten. Om möjligheterna finns är det att föredra att kräftorna för utsättning helst skall härstamma från det aktuella vattensystemet för att bevara den genetiska variationen.

Utsättningen av kräftorna bör ske på sådana bottnar som har god tillgång på både gömslen och föda. Tidigare kända lokaler som hyste goda kräftbestånd i alla storlekar är en bra utgångspunkt om var en utsättning kan ske.

Tidpunkten för utsättningar varierar beroende på vilket utsättningsmaterial man använder sig av. Vid utsättning av försträckta yngel av stadium IV (tre skalbyten) dvs. yngel som är kläckta i odlingsmiljö inomhus med tempererat (17-20°C) vatten, bör man vänta med utsättningen av ynglen tills vattentemperaturen uppnått ca 15°C (juni). Dels för att inte temperaturskillnaden skall bli för stor samt för att produktionen av födoorganismer i utsättningsvattnet skall ha kommit igång. Vuxna kräftor kan utplanteras från försommaren fram till september, rent generellt kan man säga att all utplantering bör ske under försommaren (maj – juni) beroende på väderleken, kräftorna har därmed hel sommar att etablera sig i sin nya miljö.

Vid utsättning av yngel får man ett



Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

*Bertil Nordström proviskar efter misstänkt illegalt utplanterade signalkräfter i Ragvaldstjärn, Sunne kommun.*

mer stationärt bestånd, ynglen har inte samma benägenhet att vandra iväg jämfört med vuxna kräftor. Vid utsättning av yngel är det lämpligt att fördela utsättningen under en 3 – 5 års period. Dels för minimering av risken för misslyckade utsättningar, trots goda förberedelser kan ekologiska samband vara svåra att förutsäga varför det finns skäl till försiktighet. För ytterligare fakta om yngelutsättning se rapporten ”Råd och rekommendationer för vidareutveckling av nyetablerade kräftbestånd” av Mikael Persson. Rapporten finns tillgänglig på vår hemsida: [www.astacus.org](http://www.astacus.org).

Mängden kräftor man skall plantera ut är svårt att säga, oftast är det tillgången på pengar som avgör storleken på utsättningen. Könsfördelningen i viltvatten bör vara 50 – 50 jämfört med i odlingar där man brukar använda en hane på tre honor.

Vuxna kräftor har en benägenhet att vandra iväg från utsättningsplatsen, därmed får kräftorna svårt att hitta varandra under parningstiden eftersom kräftorna är utspridda inom ett stort område. Kräftorna bör därmed

sumpas under ca en vecka på utsättningsplatsen innan själva utsläppet. Vid utsättning av vuxna (vildfångade) kräftor är det svårt att avgöra vilken ålder kräftan har. Kräftans bästa förökningsperiod är relativt kort, honor som sätter rom för tredje gången är i absolut bästa ålder med avseende på rommens kvalitet och kvantitet. Utplantering av gamla kräftor ger därmed ett mager resultat.

Mängden utplanterade vuxna kräftor bör inte understiga två kräftor per löpmeter. Det är bättre att klumpa ihop utsättningen inom ett begränsat område för att säkerställa föryngring jämfört med att sprida ett begränsat antal kräftor runt en sjö eller längs ett vattendrag.

## 6.6 Flyttning av kräftor

Efter lyckade nyintroduktioner, kalkning eller andra kräftvårdande åtgärder som medfört ett etablerat bestånd, kan man flytta kräftor till andra delar av vattnet för att påskynda den naturliga spridningen. Provfiske enligt en standardiserad metod (se nedan) kan ge en upp-

fattning av hur bra kräftbeståndet är i lokalen. Flyttning av kräftor kan påbörjas när provfiske uppvisar 1-2 kräftor/mjärde och natt, vilket anses vara tillräckligt för att fiska kräftor utan att påverka kräftbeståndet. Kräftfiske med mjärddar fångar bara en bråkdel av de kräftor som faktiskt finns.

Även vid täta kräftbestånd eller ett alltför tätt och småvuxet bestånd, kan det vara en god idé att flytta kräftor till lämpliga, obesatta lokaler. Utglesning av beståndet leder till att man minskar konkurrensen kräftorna emellan. Samma kriterier som för utplantering gäller även vid flyttning av kräftorna.

En naturlig spridning sker i takt med att kräftbeståndet ökar, men det kan ta lång tid eller de kan t.o.m. bli begränsade i sin spridning pga. att de undviker mjuka bottenar. Idealiska steniga grundvatten runt isolerade öar och grynnor kan vara tomma på kräftor för att omgivande mjuka bottenar hindrar invandring. För omflyttning tas lämpligen köns mogna individer som kan para sig redan samma höst. Sätt ut dem (enligt ovan, Utplantering) samlat i grupper på lämpliga bottenar. Även vid flyttning bör kräftorna sumpas något dygn på den nya utsättningsplatsen. Eventuellt kan man utfodra dem tillfälligt före frisläppandet.

### 6.7 Spridning och nyetablering av kräftor med hjälp av sumpar

En annan metod med flyttning av



Foto: Länsstyrelsen i Värmland

köns mogna kräftor är att sumpa kräftor vid de nya lokalerna. Parningen sker i sumpen i september-oktober, efter parningen plockar man bort hannarna, kvar i sumpen får honorna vara. Under tiden från parningen fram tills rommen kläcks i juni-juli är honorna skyddade i sumpen. Äggkläckningen sker i sumpen och yngel kommer att ta den nya lokalen i besiktning. Rapport med ritning på sumpar, parning i sumpar ("Källarodlingsmanual") finns på hemsidan [www.astacus.org](http://www.astacus.org).

### 6.8 Regler för kräftfisket

Från och med 1994 finns inga lagar eller förordningar kring minimimått eller fångsttider för kräftor. Ingen annan än ägarna till fisket bestämmer när de skall fiska samt vilka storlekar man vill fiska. Det vanliga fiskbeståndet i ett fvf är en tämligen rörlig resurs och därigenom kan betraktas som ett gemensamt värde för berörda fiskrättsägare inom fvf. Kräften är däremot betydligt mer stationär vilket kan innebära stora skillnader i förekomst och täthet mellan olika delar inom ett fvf. I detta förhållande ligger både problem och möjligheter. Problem uppstår om det inte från början finns klara accepterade rekommendationer om hur beståndet skall utnyttjas. Möjligheterna är uppenbara eftersom de kräftbefrämjande åtgärder som vidtas på en viss plats kommer de/dem som visat engagemang tillgodo. För att en satsning på kräftor ska komma hela fvf till del är det alltså nödvändigt att man är helt överens om de regler som skall gälla. Vikten av enighet kan inte nog poängteras. Därför är det viktigt att vid fiskstämor/årsmöten klargöra vilka råd och rekommendationer man bör följa för att utnyttja kräftbeståndet på bästa sätt samt att förklara varför man inför råden och rekommendationerna.

Man kan fiska hårt och ofta i kräftvatten framför allt efter hannar. Man

kan inte fiska sönder ett bestånd om man konsekvent håller sig till vissa minimimått som säkerställer att kräftorna har fått para sig minst en gång. En god regel är att fiska upp honor över 10,5 cm och hannar över 10,0 cm (möjligen 10,0 resp. 9,5 cm).

Det är en god kräftvård att fiska bort stora kräftor, eftersom vuxna kräftors kannibalism på yngel kan vara mycket påfallande. Dessutom är flodkräftan en revirhävdande art, i kräftbestånd råder en uttalad dominansordning. Detta innebär att stora kräftor dominerar över mindre. Denna ordning medför att de starkaste kräftorna ockuperar de bästa bottenarna med de bästa gömslena och med den bästa födotillgången. De stora revirhävdande kräftorna trycker tillbaka de mindre kräftorna som då hindras att söka föda på de bästa lokalerna vilket för dessa medför en försämrad tillväxt. Stora kräftor kan vara snabbväxande eller gamla kräftor. Gamla kräftor blir med åren infertila. Däremot fortsätter de att hävda revir, framförallt under parningstiden. Detta medför att en gammal hane kan hävda ett flertal honor under parningstiden som därmed förhindras att paras med andra hannar. Alltså, vid bortfiskning av stora kräftor kommer de kvarvarande kräftorna få en större tillväxt, då födotillgången och mängden attraktiva gömslen ökar, mängden parade honor kan ökas och dessutom får ynglen en större överlevnadschans.

När fisket skall påbörjas kan vara olika från år till år beroende på hur varm framförallt försommaren har varit. Vid en kall sommar kan honorskalbyten ske först i mitten av augusti medan varma somrar medför, framför allt för hannar, ett andra skalbyte i mitten av augusti. Sker fisket för tidigt på säsongen under en period av hög skalbytefrekvens får man en dålig fångst och en misstolkning kan göras med avseende på beståndstätheten i vattnet.



Foto: Trond Taugbøl, NINA

Ett komplement till provfiske med mjärddar är dykinventering.

Kräftfisket bör sålunda inte påbörjas för tidigt på säsongen och man bör fiska hårt vid flera olika tillfällen under senare halvan av augusti och i början på september under förutsättning att man konsekvent håller sig till de givna storleksgränserna. Det är värre att endast fiska en gång under året. Risken finns att man vid ett kräftfiske under året får de honor som är avklarade med skalbytet och förbereder sig inför parningen medan övriga kräftor är i färd med att byta skal och dem får man först senare.

Om problemet är ett småvuxet och tätt bestånd bör de stora kräftorna istället få vara kvar för att gallra bland de små kräftorna.

### 6.9 Provfiske - Värdering av kräftbestånd utifrån fångst per insats

All fiskevård måste grunda sig på att man vet hur beståndet ser ut. Dessutom är det viktigt att följa de kräftvårdande åtgärder man utför i sitt vatten för att följa upp dess effekter. Provfiska och dokumentera därför all-

tid fisket. Provfiske av kräftor kan ske inom det reguljära fisket med några kompletterande moment, bl.a. mätning av kräftorna, könsbestämning och notering av skador eller att man utför ett standardiserat provfiske. Metodiken för ett standardiserat provfiske med protokoll finns att ladda hem från Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets hemsida, länkarna finns tillgängliga på vår hemsida [www.astacus.org](http://www.astacus.org). Metoden bygger på antal fångade Kräftor per Mjärde och natt (K/MN). Vid användandet av en standardiserad metod för provfiske av kräftor kan man bl.a.:

\* Kvantifiera och beskriva kräftbeståndet på enstaka lokaler eller i hela sjön eller vattendraget.

\* Undersöka förändringar i täthet och

storleksstruktur hos kräftbestånd över tiden på fasta lokaler dvs. uppräta tidsserier.

\* Möjliggöra jämförelser av kräftpopulationer mellan olika vatten.

K/MN ger ett relativt mått på tätheten av kräftor i lokalen. Osäkerheten och variationen i K/MN är emellertid stor. Fångsten i mjärddar varierar med tiden och är först och främst avhängig av skalbytesfasen och temperatur. Före under och efter skalbytet (1-2 veckor), är kräftan väldigt svår att få i mjärddar. Andra faktorer som påverkar mjärdfångsten är t ex.: tidpunkten för fisket, mjärddtyp, bottensubstrat, månfas, närhet av fiskpredatorer, åtelfisk, tillgång på naturlig föda. Vid provfiske med 50 mjärddar i en lokal i Glomma, Norge, fångades en kräfta. Medan en dykinventering i samma lokal visade att det fanns ett gott kräftbestånd i lokalen. Detta betyder att man bör vara försiktig vid bedömning av resultaten av ett provfiske med mjärddar. Det är alltså svårt att ge några klara kriterier för att bedöma ett kräftbestånd utifrån K/MN. Som en tumregel kan följande värden användas (Tabell 3)

Mjärdfångst av kräftor är även storleks- och köns- selektiv. Det fångas större kräftor och fler hannar än beståndet i övrigt. Kräftor mindre än 7,5 cm fångas sällan i mjärddar. När man fiskar med kräftburar brukar man anse att en bur fiskar en yta ungefär fem till sju meter i radie från där buren ligger. Detta gäller för relativt stillastående vatten i sjöar. I strömmande vatten fiskar en bur i stort sett bara de kräftor som finns nedströms buren.

**Tabell 3 Tumregel för bedömning av kräftbestånd med hjälp av resultatet från ett provfiske. K/MN (Antal fångade kräftor per mjärde och natt)**

K/MN	
<0,5	Väldigt svagt bestånd
0,5 < 2,5	Svagt till medelst bestånd
2,5 < 5	Bra bestånd
> 5	Mycket bra bestånd

## 7 Skötselområde:

### Östen - Töck

Två fvof har gått samman och bildat ett skötselområde för att gemensamt bevara och att förbättra de bestånd av flodkräftan (*Astacus astacus*) som finns kvar inom skötselområdet. Skötselområdet är beläget i västra Värmland, i Årjängs kommun (karta 1). Den gemensamma faktorn för dessa två fvof är att deras vatten mynnar i sjön Töck. De två fvof delar på ett gemensamt vatten vilket medför att de två fvof mer eller mindre är beroende av varandra. Kräftfisket ingår i Östervallskogs Fvof, men fiskerätten varierar för olika områden enligt gammal hävd med avseende vem som får fiska var o.s.v. Även i Töck-Hurrsjöarnas FVOF ingår kräftfisket i föreningens stadgar. Fvof har därmed rätt att sätta regler för hur fisket bedrivs. Ordförandena i de två fvof för skötselområdet är:

#### Töck-Hurrsjöarna fvof

ordf. Lars Persson

0573-260 14, 0705-61 27 54

#### Östervallskog fvof

ordf. Raimo Haglund

0573-620 53

Skötselområdet Östen - Töck avrinningsområde utgörs framförallt av försurningskänslig mark vilket medfört utslagning och försämring av tidigare befintliga kräftbestånd. Sedan 1984 kalkas området regelbundet enligt länsstyrelsens kalkningsplan. För att undersöka och följa upp och värdera kalkningsinsatserna utför Länsstyrelsen årligen vattenprovtagning, botten & litoralfauna undersökningar samt el-fisken på strategiska lokaler inom området. Vattenkemin undersöks med avseende på pH och alkaliniteten, botten- & littoralfaunan undersöks för att bedöma om det finns en försurningspåverkan på lokalerna. De vattenkemiska värdena ger endast en ett ögonblicksvärde för tillståndet i lokalerna. Kalkningen har resulterat i förbättrade och stabila vattenkemiska förhållanden, vilken möjliggör återin-

troduktioner och andra åtgärder i syfte att förbättra de flodkräftbestånd som har funnits eller fortfarande finns i området.

#### 7.1 Närmast kända signalkräftbestånd

Den närmsta kända lokalen där signalkräfter förekommer befinner sig ca 2 mil söderut i samma vattensystem, vid Holmerudsälvens mynning i Stora Le. Signalkräftorna är illegalt utplanterade. Signalkräftorna kan teoretiskt, på lång sikt, sprida sig i Stora Le vilken mynnar i Foxen och vidare uppströms mot Töcksfors. Detta kan dröja åtskilliga år om det överhuvudtaget är möjligt. Den största risken att signalkräftorna hotar flodkräftbestånden i Töcksfors är via illegalutplantering av signalkräfter.

#### 7.2 Målsättningen för skötselområdet Östen - Töck är att:

- Hindra ytterligare illegala utplanteringar av signalkräfter (*Pacifastacus leniusculus*)
- Hindra spridning av kräftpest (*Aphanomyces astaci*)

- Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
- Ha en stabil vattenföring i de rinnande vattendragen
- Det finns tillräckligt med bon och gömslen
- Undvika överfiskning
- Bedriva minkjakt
- Vid behov, återintroducera kräftor
- Årligt inventera flodkräftbestånden
- Informationsspridning om kräftor och spridning av kräftpest

#### 7.3 Skyddsplan för hela skötselområdet

Den närmaste kända sjö/vattendrag med signalkräfter utanför skötselområdet är Holmerudsälvens mynning i Stora Le, ca 20 km fågelvägen från Töcksfors.


Signalkräfter har inga möjligheter att på egen hand ta sig in i skötselområdet från nedströms liggande områden. Två definitiva vandringshinder finns i Töcksfors. Däremot finns risken för ytterligare illegala utplanteringar med signalkräfter och därmed spridning av kräftpest. Kräftpest finns där signalkräfter finns, således finns kräftpes-



På väg mot kräftfiske med båten full av redskap.

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

# Skötselområde Östen-Töck



ten permanent vid Holmerudsälven och i Stora Le. Risken med att sprida smittan vidare från dessa vatten till angränsade vatten är t ex. via fuktiga redskap, fisk som används till bete eller agn mm.. Skötselområdet är beläget i den översta delen av Dalslands kanal vilket är en uppskattad båt- och kanotled. Årligen sker ca 100 slussningar av båtar och kanoter i Töcksfors. Detta medför risker med införsel/spridning av smittat fuktiga redskap eller vatten, från nedströms liggande områden (Holmerudsälven och Stora Le) som hyser signalkräftor.

#### **7.4 Vandringshinder för att hindra en tänkbar pesthärd inom skötselområdet**

Det finns endast två lämpliga vandringshinder inom skötselområdet där man teoretiskt kan stoppa en tänkbar pesthärd. Vandringshindren är belägna vid utloppet sjön Nedre Hurr och i Rommenäsälven. Med hjälp av dammarna kan man strypa vattnet och man kan höja pH till 12,5 med hjälp av släkt kalk ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ), vilket medför att allt liv i en begränsad sträcka dör. Det höga pH-värdet måste verka under 1-3 dygn för att säkerställa att alla kräftor dör inom önskat området. När kräftorna dött bildas en kräftfri zon vilket medför att smittan inte kan spridas uppströms i systemet. Samtidigt är det mycket viktigt att hindra att minkar vandrar upp- och nedströms förbi dammen vid en aktuell pesthärd. Minken kan ha sporer i pälsen eller framförallt transportera smittade kräftor förbi dammen under ett pestutbrott, och på så vis har pesthärden tagit sig förbi vandringshindret. På en väl strategisk plats alldeles nedströms dammen avgränsas älvfåran med hönsnät. I hönsnätet skapas hål vilket minkfällorna placeras i.

#### **7.5 Åtgärder för att förebygga en tänkbar spridning av kräftpest inom skyddsområdet**

Ett sätt för att försöka hindra den okontrollerade spridningen av signalkräftan och kräftpesten är genom informationsspridning. Många illegala utplanteringar sker i oförtstånd och utan att man är medveten om konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen om vad kräftpesten är och hur den sprids samt hur man undviker att sprida kräftpesten. Dessutom bör man uppmärksamma män-

niskor som vistas utmed vattendragen att det förekommer flodkräftor i systemet för att uppmäna till försiktighet. Via informationstavlor uppsatta på strategiska platser (bad-, camping-, båtplatser och framför allt vid de aktuella vattnen med flodkräftbestånd), kan man nå ut till människor för att upprepande påminna dem om farorna med signalkräftor och kräftpestens spridningsvägar



Foto: Länsstyrelsen i Värmland

### **8 Driftplan för Östervallskog FVOF**

#### **8.1 Organisation och förvaltning**

Östervallskogs FVOF bildades i mitten av 1980-talet och består av ca 500 fiskrättsägare fördelade på 12-13 hemman. FVOF förvaltar i föreningsform fiskerätten. Fiskerättsägarna äger full suveränitet rätt att sätta upp regler för hur kräftfisket skall bedrivas och förvaltas inom FVOF. FVOF säljer fiskekort för

kräftfiske till allmänheten i Östen, Strömmesjön, kanalerna mellan Östen – Strömmesjön – Töck samt övre i delen av Töck. I övriga kräftförande vatten inom FVOF är det endast de med fiskerätt som får fiska kräftor inom respektive hemman. Undantaget är Rommenäsälven som är belagd med fiskförbud.



Almtjärn

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

## 8.2 Sjöarna och vattendragen

FVOF omfattar ett flertal sjöar och vattendrag (se karta 2). Men det är framförallt i rinnande vatten som flodkräftorna har haft de högsta tätheterna. Sex vattendrag har hyst och fortfarande hyser ett kräftbestånd (tabell 1), medan ett tjärn numera troligen inte längre hyser några kräftor. Tillrinningsområdet till de kräftförande vattendragen består mestadels av skogsmark och till viss del myrmark. I Ivarsbyälven, Rommenäsälven och Torpedalsälven förekommer sjövandrande öring och Östen hyser även glacialrelikter, som omfattas av särskilda föreskrifter. Rommenäsälven är påverkad av reglering. Fvof (Ivarsbyälven) blev troligen drabbade av kräftpesten i början av 1970-talet, vilket dock aldrig kunnat konstateras. Tidigare fanns en bra ål bestånd, under 1960-talet fick man mycket ål på långrev, numera får man mycket sällan ål. I enstaka skogstjärnar bedrivs utsättning med öring för "Put and Take" - fiske.

## 8.3 Kalkning

Östervallskogs FVOF ingår i åtgärdsområde nr 101 och 103 enligt länsstyrelsens kalkningsverksamhet, kalkning har pågått inom området sedan 1984. Enligt länsstyrelsens kalkningsplan är den kemiska målsättningen med kalkningen att hålla ett pH över 6 i de vattendrag som idag hyser ett kräftbestånd. I samtliga kräftförande vatten förutom Kyrkebytjärn, utförs kalkningsåtgärder i eller uppströms i systemen. Provtagningspunkter för uppföljning av kalkningsverksamheten med avseende på vattenkemin (pH och alkalinitet) finns i Torpedalsälven, Ivarsbyälven, och Almtjärn. De vattenkemiska värdena ger endast en ögonblicksvärde för tillståndet i lokalerna. Riktlinjerna för pH och alkalinitet för flodkräftor är att pH inte bör understiga 6,5 och alkaliniteten bör vara högre än 0,1 mekv/l.

Som ett komplement till de vattenkemiska undersökningarna utförs bot-

tenfaunaprovtagningar och el-fisken i Ivarsbyälven och Torpedalsälven. 2002 utförde Länsstyrelsen provfisken efter flodkräftor i Ivarsbyälven och Torpedalsälven.

## 8.4 Risken för spridning av kräftpest till FVOF

Tänkbara spridningsvägar av kräftpesten till FVOF är förutom illegal utplantering av signalkräftor, framförallt via båt- och kanottrafiken i Dalslands kanal. Östen är den slutstationen för kanalen, vid Östen finns en populär gästhamn vilket medför hög aktivitet med turister och därmed risken med att teoretiskt transportera smittade fuktiga redskap från andra vattensystem. En kommunal badplats är även belägen i nordvästra delen av Östen, badplatsen är dock i mindre skala. De fiskeutsättningar som bedrivs är på sådana lokaler som inte är i anknäring till befintligt flodkräftbestånd.


## 8.5 Mink

Minken fanns inom området under 1960-talet, under den period när det fanns mycket gott om kräftor i området, men man anser inte att minken är en av anledningarna till kräftornas tillbakagång. Man har under ett flertal år bedrivit en lyckad intensiv minkjakt. De årliga fångstrapporterna vittnar om en kraftig tillbakagång av minkbeståndet. I slutet av 1990-talet hade man en årlig inrapportering av ca 15-20 minkar årligen medan de senaste åren har det endast inrapporterats ca 3-6 minkar årligen. Man har haft under alla år 200 kr i "skottpengar" på

**Tabell 1 Data för de sjöarna/vattendragen som har hyst eller hyser ett flodkräftbestånd i Östervallskogs FVOF**

Sjönamn/vattendrag	Hyser kräftor	Strandlinje(km)	Vattendragsläng(km)	H.ö.h
Ivarsbyälven	x	4,0	132 - 112	
Östen	x	23,0	112	
Rommenäsälven	x	1,0		
Strömmesjön	x	13,5	111	
Torpedalsälven	x	5,3	142-110	
Kyrkebytjärn	?	1,3	112	
Almtjärn	x	2,0	168	

# Östevallskog fiskevårdsområde



mink, kommunen bidrar med 100 kr, Fvof och JVO med 50 kr vardera.

### 8.6 Kräfftiske

Genom försäljning av ett fiskekort för allmänheten finns möjligheter även för de utan fiskerätt att bedriva kräfftiske inom fvof. Fiskekortet gäller för sjöarna Östen, Strömmesjön övre delen av Töck samt därtill hörande kanaler. Reglerna, som gäller för alla som fiskar kräftor, är att det är ett datum för kräftpremiären och fisket varar september ut med en kostnad av 10 kr/bur. Fisket för allmänheten är väldigt uppskattat samtidigt som det ger en bra inkomst till FVOF, som möjliggör satsningar till förbättrande av flodkräftbeståndet.

### 8.7 Åtgärder för hela FVOF

- Informationsspridning, informationstavlorna om kräftor och spridning av kräftpest
- Årlig inrapportering av kräftfisket till fvof. T ex. kan man för varje sålda kort som säljs medföra en blankett där man kan rapportera in lokal, datum, storlek, antal, kön, antal redskap, fångst per redskap mm. för att följa upp utvecklingen av kräftbeståndet. Samtidigt kan även informatio-



Foto: Trond Taugbøl, NINA

Exempel på biotåpvård av en sjöbotten. Man har kört ut sten på isen. Till höger på bilden syns hur botten såg ut innan åtgärderna.

nen spridas om bl.a. kräftor och kräftpesten.

- Säkerställa vattenföring i Rommenäsälven genom kontakter med kraftverksägarna både på norska och svenska sidan.
- Fortsatt minkjakt med inrapportering.
- Biotopvård/sumpning av köns mogna kräftor i Östen, Strömmesjön och Töck för att förbättra kräftbeståndet.
- Spridning av kräftor i Ivarsbyälven och Torpedalsälven.

- Fortsatt återintroduktion i Almtjärn
- Halstjärn har tidigare haft flodkräftor, förutsättningarna för en återintroduktion bedöms som mycket goda.
- Provfiska Halstjärn
- Stödutsättning/Åter introduktion i Kyrkebytjärn.
- Undersöka förutsättningar för flodkräftor i Mögsjön.

### 8.8 Ivarsbyälven

Ivarsbyälven har sina källflöden väster om Skillingmark och Koppom och ingår i Långebäckssystemet för att tillslut mynna i Östen i Östervallskog, Årjängs kommun, systemet ingår i Upperudsälvens avrinningsområde. Älven har två namn, sträckan nedströms Vittsjön och Bottnertjärn kallas Bottnerälven och resterande sträcka från Bottnertjärn till dess mynning i Östen heter den Ivarsbyälven. Tidigare bedrevs en intensiv flottning i systemet och med det fanns det ett flertal mindre dammar som numera mer eller mindre rivna. Ivarsbyälven är inte påverkad av reglering utan följer det naturliga fluktuationerna. Första sträckan, Bottnerälven som är ca 1,6 km långt, är framförallt av lugnflytande och strömmande karaktär med inslag av forsande



Foto: Trond Taugbøl, NINA

Exempel på en lyckad biotåpvårdsinsats på en sjöbotten. Kräftbeståndet i sjön har 10 år efter insatsen ökat från enstaka kräftor/ha till uppskattningsvis 20 kg/ha.

partier. Bottnertjärn är kraftigt igenväxt, vilket medför att det inte förekommer kräftor i tjärnet. När flottningen pågick var tjärnet öppet och med mycket kräftor. Nedströms Bottnertjärnet börjar Ivarsbyälven, sträckan är ca 1.6 km och består framförallt av lugnare partier med inslag av mindre forssträckor. På vissa partier består botten av styv lera där man ser bohålorna efter kräftorna. Både Bottnerälven och Ivarsbyälven har mycket lämpliga biotoper för kräftor, men på vissa delar finns behov av biotopvårdande åtgärder. 2002 provfiskade Länsstyrelsen älven, en provtagningspunkt var belägen uppströms Bottnertjärn medan två provpunkter är belägna i Ivarsbyälven. Resultatet tyder på ett kräftbestånd som håller på att återetableras. I den bästa lokalen fångades 129 kräftor på 20 burar vilket gav 6,5 kräftor per bur och natt vilket visar på ett mycket bra bestånd för den lokalen.

### 8.9 Vattenkemi

I Ivarsbyälven inleddes kalkningen 1984, bakgrunds pH för kalkningen är 6,0. Sedan dess har kalkningen utökats i etapper, motivet för kalkningen är stationär öring, mört och flodkräfta. Vattenkemin följs upp med vattenkemiska analyser, elfisken samt bottenfaunaundersökningar för att följa upp kalkningseffekterna. Sedan 1999 har Ivarsbyälven uppvisat ett



Tidig morgon, på väg för att vittja kräftburarna.

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

relativa stabila pH värden. Vid ett mättillfälle har pH understigit 6 och alkaliniteten har vid två mättillfällen understigit 0.05 mekv/l. Bottenfaunan har undersökts 1999 samt 2002, båda omgångarna uppvisade ”ingen eller obetydlig påverkan” av försurning. Elfisket har haft en negativ trend vid de två senaste provfiskena, vilka faktorer som påverkar detta är oklar, dock kan de höga vattenflödena år 2000 vara en orsak. Totalt sett verkar förutsättningar för flodkräftorna vara stabila och tillfredsställande.

### 8.10 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

Ivarsbyälven var ett väldigt bra kräftfiskevatten under mitten av 1900-talet, i många år fångades stora mängder med kräftor under augusti, de som fiskade hade problem med att kräftorna åt upp betet för snabbt, en mört blev uppäten på mindre än 10 minuter. Det blev ett intensivt vittjande för att hela tiden se till att det fanns bete i mjärdarna. De bästa lokalerna var nedströms Bottnertjärn. Förr fanns det även kräftor i Bottnertjärn, med efter att flottningen upphörde började tjärnet att växa igen. Enorma mängder med kräftor fångades fram tills slutet av 1960-talet. Flera uppköpare kom dagen efter premiären köpte upp flodkräftor av fiskerättsägarna. Det finns dock inga uppgifter om vilka mängder med flodkräftor som såldes från älven.

2005 är kräftbeståndet på god väg tillbaks. Egna provfiske och provfiske utfört av länsstyrelsen uppvisar på goda lokala bestånd varvat med lokaler som har mycket klens bestånd. Det är framförallt i forsarna som det idag har ett bra bestånd, förr



Foto: Per Adolphson, Fiskeriverket

Flodkräftbeståndet är på uppgång i flera av våra vattendrag.

var det tvärtom, det var i de mer lugnare partierna som de tätaste bestånden fanns. Hela älven hyser mycket goda förhållanden för kräftor, botten har även inslag av blålera.

Mellan åren 1985-1990 utförde fvf provfiske på 2 sträckor med 20 mjärdar utan resultat. Man fortsatte provfiske fram tills 1999-2000 då man fick de första flodkräftorna. En blygsam utplantering med 200 små kräftor hade då skett från Östen. Av denna lilla utsättning har nu kräftbeståndet börjat öka med mycket bra fångster med avseende på den korta tiden och den blygsamma utsättningen 1999. Man fångade 2005 även kräftor i Bottnerälven

### 8.11 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

Försämringen kom och gick väldigt snabbt. 1969 var ett bra fiskeår men efter bara några år blev det helt tomt med kräftor och man kunde inte fånga en enda kräfta. Man misstänkte därmed att pesten kommit till systemet. Troligen började även försurningen göra sig påmind under denna period. Den tidigaste dokumentationen av pH är från 1979-1980, de värden uppvisade pH mellan 5,7-6,1. Idag inger inte försurningen ett direkt hot så länge systemet kalkas, det absolut största hotet mot Ivarsbyälven är illegal utplantering av signalkräfter. Övriga hot mot Ivarsbyälven är om en kräftpest kommer nedströms via sjön Östen, det finnas inga vandringshinder utefter sträckan som kan utgöra ett skydd för älven.

### 8.12 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Ivarsbyälven

- Spridning av befintligt kräftbestånd för att snabbt bygga upp ett fiskbart kräftbestånd längs hela sträckan i både Ivarsbyälven och Bottnerälven.
- Riktat fiske mot stora hanar, man bör dock vara försiktig med att plocka bort de stora djuren när ett bestånd

är på väg att återetableras. Men i takt med att beståndet ökar bör man plocka bort de stora hanarna framförallt, hanar som är större än 11 cm.

- Minkjakt
- Tag fram tydliga rekommendationer för hur kräftfisket skall bedrivas när det gäller tider samt vilka mått samtliga bör eftersträva efter, t ex hanar 10,5 cm och honor 11 cm alternativt 10 cm för hanar resp. 10,5 cm för honor.

### 8.13 Östen/Strömmesjön

#### 8.14 Vattenkemi

En provtagningspunkt finns vid utloppet ur Östen, dessutom finns två bottenfaunalokaler i sjön. De vattenkemiska värdena uppvisar mycket stabila tillfredsställande värden, pH har varierat mellan 6,2-7,1 och alkaliniteten har aldrig understigit 0,05 mekv/l sedan 1999. Bottenfaunaundersökningarna uppvisar inte heller några tecken på försurning.

#### 8.15 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

De båda sjöarna har aldrig hyst ett bra flodkräftbestånd, visserligen ha man fiskat lokalt i sjöarna men man kom aldrig i närheten av de fångster man fick i t ex Ivarsbyälven. De var

framför allt vid kanalerna som kräftorna fanns/finns. Kanalerna finns vid de båda sjöarnas utlopp. Det finns fortfarande kräftor i kanalerna och beståndet ökar successivt.

### 8.16 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

Eftersom det aldrig varit ett bra kräftbestånd i sjöarna har man aldrig noterat någon större nedgång i beståndet, däremot har det aldrig varit helt tomt med kräftor. Varför det aldrig lyckats etablerats sig ett bra kräftbestånd i sjöarna när det fanns så otroligt bra med kräftor i tillflödena är mycket svårt att säga. En faktor kan vara förekomst av ål. Ål i kombination med abborre är ett stort hot mot ett bra kräftbestånd, dessa förhållanden var mycket vanligt förr. Numera minskar utsättningarna med ål vilket på sikt borde gynna flodkräftbeståndet.

Hotbilden mot de båda sjöarna är, förutom illegal utplantering med signalkräfter, båttrafiken i systemet. Dessa kan teoretiskt transportera med sig smittat vatten eller redskap från nedströms liggande områden som hyser signalkräfter.



Länsstyrelsen provfiskar ett vattendrag.

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

### 8.17 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Östen och Strömmesjön

- Biotopvård på väl strategiska platser för att försöka skapa optimala förhållanden för kräftor och på sikt bygga upp fiskbara bestånd lokalt på dessa områden. Med hjälp av natursten, stockar, grenar, mm. för att skapa dessa förhållanden.
- Informationsspridning intill båtplatser mm. för att undvika spridningen av kräftpest.
- Minkjakt

### 8.18 Rommenäsälven

Älven har sina källor från Römsjön på den Norska sidan. Det finns två kraftstationer som utgör definitiva vandringshinder, en är belägen på den norska sidan nedströms Römsjön samt en kraftstation är belägen ca 600 meter innan den mynnar i Östen. Regleringen från den Norska sidan är väldigt påtalig och har en tydlig effekt på vattendraget. Rommenäsälvens nedre sträcka är biotopvårdad för öring, vilket även gynnat flodkräftor. Älven hyser mycket goda förhållanden för kräftor. Det finns fyra olika lokaler utefter älven där man undersöker bottenfaunan, kräftbeståndet, vattenkemin samt elfiske. Syfte är att följa upp kalkningseffekten på vattendraget.

### 8.19 Vattenkemi

Rommenäsälven är kalkningspåverkad sedan 1988. Sjö kalkning bedrivs årligen uppströms på den norska sidan i Römsjön. Bakgrunds pH för kalkningen är 6,1 och motivet för kalkningen var att flodkräftorna minskat uppströms i Römsjön på den norska sidan. De vattenkemiska resultaten visar ett mycket stabilt pH och alkalinitet. pH och alkaliniteten har aldrig understigit 6,2 respektive 0,05 mekv/l vid mättillfällena sedan 1999. Bottenfaunan har undersökts vid tre tillfällen 1995, 1999 och 2002, och har bedömts till "Ingen eller obetydlig påverkan av försurning".



Torpedalsälven

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

### 8.20 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

Flodkräftor finns och har alltid funnits i älven. De överlevde 1970-talets nedgångar. Älven har även varit fredat under en längre tid med avseende på att kunna utnyttja den som en sorts avelskammare, för vidare spridning av kräftor till Östen och Ivarsbyälven. Sträckan nedströms kraftstationen visar på höga tätheter med flodkräftor, vid provfiske kunde man konstatera 8,1 kräftor per bur och natt. Vilket anses som ett bestånd med höga tätheter.

### 8.21 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

Det största hotet mot Rommenäsälven är att kräftpesten kommer nedströms från Östen. Det finns inga andra hot förutom illegal utplantering, men den risken torde vara liten beroende på fröf stora strävan att utveckla och bevara flodkräftor i området. Flodkräftorna är väl förankrade i bygden. Eftersom vattendraget är reglerat finns alltid risken med torrläggning vilket skulle vara förödande för kräftbeståndet. Den nuvarande dammen "läcker", detta läckage säkrar vattenföringen för älven i nuläget.

### 8.22 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Rommenäsälven

- Informationsspridning
- Minkjakt
- Säkerställ vattenföringen (regleringen) både på svenska och norska sidan.
- Ytterligare biotopvård för att skapa gömslen och boplatser.

### 8.23 Torpedalsälven

Torpedalsälven avvattnar närmast Kroksjön, men har sina källor på den norska sidan. Älven strömmar genom mycket skiftande miljöer, alltifrån myrmarker, barrskog och jordbrukslandskap. Som så många andra vatten har även Torpedalsälven används som flottningsled vilket medfört omfattande påverkan på bottenstrukturen. Några tänkbara vandringshinder för att stoppa en tänkbar pesthärd finns inte längs med sträckan. Det finns mycket goda förutsättningar för kräftor i älven med avseende på boplatser och gömslen, med undantag av de nedre delarna av älven där biotopen består mestadels av finsediment och sand. Under sommaren 2005 skedde en utplantering av 5000 kräfttyngel på väl utvalda lokaler längs med älven. Torpedalsälven har varit kalkningspåverkad sedan 1984 och

har flodkräftor som motiv för kalkningen. Länsstyrelsen har fyra punkter längs med älven för elfisken, vattenkemi, bottenfauna samt kräftinventering. Syftet är att följa upp kalkningen i systemet.

#### 8.24 Vattenkemi

Torpedalsälven uppvisar ostabila värden med avseende på pH och alkalinitet. pH har understigit 6,0 vid fem tillfällen sedan 1999. Även alkaliniteten har varierat kraftigt mellan 0,03 till 0,24 mekv/l vid mätillfällena. Punkten för vattenkemin är vid utloppet ur Kroksjön vilket kanske inte speglar de rätta vattenkemiska värdena längre nedströms i älven. Bottenfaunan har undersökts 1993, 1996, 1999 och 2002. Vid de tre första undersökningarna visade resultaten på "ingen eller obetydlig påverkan av försurning" medan undersökningen från 2002 visade på ett gränsfall mellan "ingen eller obetydlig påverkan" och "betydlig påverkan av försurning". Fortfarande är försurningen ett orosmoment för flodkräftorna i Torpedalsälven.

#### 8.25 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

Under 1950-talet fanns ett mycket gott bestånd i Kyrkeby tjärn vilket mynnar i den nedre delen av Torpedalsälven. Kräftorna kunde vandra ut ur tjärnet av egen kraft och etablera ett bestånd i Torpedalsälvens nedre delar. Under 1960-talet hade det etablerats ett bra bestånd utefter hela sträckan. Kunskapen om flodkräftbeståndets utveckling fram tills nutid är något oklar. Det vi vet är att vid ett provfiske utfört av Länsstyrelsen 2002 undersöktes tre lokaler. I två av dessa konstaterades kräftor. Detta tyder på att flodkräftorna aldrig slagits ut helt pga. försurningen bl.a. Vid en lokal var tätheten relativt bra (3,8 kräftor per bur och natt) vilket inger ett mycket gott tecken på att kunna lyckas etablera ett bra kräftbestånd i hela Torpedalsälven.

#### 8.26 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

Den största hotbilden mot älven verkar vara försurningen, förutom illegal utplantering med signalkräfter. De vattenkemiska värdena vid utloppet ur Kroksjön varierar kraftigt. November 2002 uppmättes pH till 5,1 vilket är oroande lågt. Förövrigt råder låg aktivitet i systemet, det finns inga kommunala badplatser, fiskutsättningar, kanotleder mm. som riskerar att transportera smittat vatten från andra avrinningsområden.

#### 8.27 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Torpedalsälven

- Följ upp kalkningsverksamheten
- Biotopvård, framförallt i de nedre delarna av älven. Skapa bon och gömslen genom att lägga ut stenar, stensamlingar, död ved mm.
- Informationsspridning
- Minkjakt
- Spridning av befintligt kräftbestånd till delar av älven som ännu inte hyser kräftor.

#### 8.28 Kyrkeby tjärn

Kyrkeby tjärn är ett litet tjärn som mynnar i Torpedalsälven. Kyrkeby tjärn kallas i folkmun föra "Gröna tjärnet" efter det grönfärgade vattnet. Tjärnet är endast 550m långt och 125 m brett och har inga tillflöden. Tjärnet ingår intet i någon kalkningsverksamhet. Under 1950-talet var inkomsterna av kräftfisket från tjärnet mycket betydande för lokalbefolkningen. Under denna period var det väldigt gott om kräftor i och i utloppet ur tjärnet.

#### 8.29 Vattenkemi

Eftersom tjärnet inte ingår i någon kalkningsverksamhet finns det heller inga uppgifter på vattenkemin eller bottenfaunan.

#### 8.30 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

De kräftor man fiskade på i sådana mängder under 1950-talet härstammar från två utsättningar som utfördes un-



Foto: Länsstyrelsen i Värmland



Foto: Per Brunström, Hushållningssällskapet

der perioden 1935-1940. Då hämtades totalt 2000 flodkräftor från Norge som planterades in i tjärnet. Efter 10-15 år efter utsättningen ökade kräftbeståndet kraftigt. Lokalbefolkningen fiskade ihop en månadslön under några dagar i augusti varje år. Kyrkebyttjärnet var dåtidens "avelskammare", det flyttades kräftor till Strömmesjön, Boviken, Kanalen mellan Strömmesjön och Töck, de övre delarna av Töck och

Torpedalsälven. Flyttningarna från Kyrkebyttjärn till dessa lokaler gav ett bra resultat med fiskbara bestånd. Man flyttade även flodkräftor till lokaler som inte lyckades, t e x Åkertjärn, Mögsjön och till Övre – och Mellan Hurr.

När och varför kräftbeståndet började minska är ännu okänt. Vi vet heller inte om det ännu förekommer flodkräftor i tjärnet eller inte.

### 8.31 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Kyrkebyttjärn

- Provfiske
- Återintroduktion/Stödutplantering alternativ flyttning från Torpedalsälven till Kyrkebyttjärn
- Informationsspridning
- Minkjakt

### 8.32 Almtjärn

Strax söder om Almtjärn finns en kallkälla som för i tiden ansågs vara en "hälsokälla". Människor kom långväga ifrån och man ansåg att vattnet hade läkande effekter både för invärtes och utvärtes bruk. Den skulle innehålla ett mycket mineralrikt vatten.

I Almtjärn kan man tydligt se att tjärnet har höga halter av järn, på botten kan man se utfällningarna av järnjonerna där det bildas fläckvis med "rostmattor" som ligger som ett lager över stenar mm. Tjärnet har kalkats sedan 1984, bakgrunds pH är 6,1. Motivet för kalkningen är mört och stationär öring och målsättningen för kalkningen är att ha ett pH över 6. Vid utloppet ur tjärnet tas vattenkemiska analyser.

### 8.33 Vattenkemi

Vid två tillfällen sedan 1999 har pH understigit 6,0 (5,7) och alkaliniteten 0,05 mekv/l. Både pH och alkaliniteten uppvisar ostabila värden.

### 8.34 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

Under perioden 1940 till 1960 fiskades det kräftor i Almtjärn, men det var inga stora mängder. De fanns endast på vissa lokaler runt tjärnet. Sporadiskt har det skett mindre utsläpp med små kräftor men sommaren 2005 gjordes en större utsättning med flodkräfttyngel i tjärnet på bekostnad av Länsstyrelsen. Det har tidigare inte utförts något seriöst provfiske och man har heller inte sett kräftor på senare tid.

### 8.35 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

Det största hotet mot kräftorna torde vara försurningen, vilket är den sannolika orsaken till varför kräftorna försvann under 1960- och 1970- talet. Med de järnhalter som tjärnet innehåller kan detta vara förödande för flodkräftorna om kalkningen upphör. Förövrigt finns det minimala risker med att kräftpesten sprids till tjärnet.

### 8.36 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Almtjärn

- Provfiske
- Biotopvård för att skapa bon och gömslen för kräftor. Syftet med biotopvården är att utnyttja så stora arealer av Almtjärn som möjligt för att öka den totala produktionen. Med hjälp av sten, stockar, grenar mm. kan man skapa de förhållanden kräftor vill ha.
- Fortsatt kalkningsverksamhet
- Informationsspridning
- Fortsatt utplantering av kräftor

## 9 Driftplan för Töck – Hurrsjöarnas FVOF

### 9.1 Organisation och förvaltning

Töck-Hurrsjöarnas FVOF bildades i början av 1990-talet och består av ca 300 fiskrättsägare fördelade på 12 hemman. FVOF förvaltar i föreningsform fiskerätten. Fiskerättsägarna äger full suveränitet rätt att sätta upp regler för hur kräftfisket skall bedrivas och förvaltas inom FVOF. FVOF säljer fiskekort för kräftfiske till allmänheten. Det är tillåtet att fiska kräftor under tre dygn som FVOF utlyser, avgiften för kräftfisket är baserat på en fast summa per bur. Beslut fattas enligt stadgar på stämman eller på styrelsemöten. Ägarskap till fisket innebär inte med automatik att man är intresserad av att aktivt utveckla och bevara fisk- och kräftresursen.

### 9.2 Sjöarna och vattendragen

Fvof omfattar ett flertal sjöar och vattendrag (se karta 3). Två sjöar Nedre Hurr och Töck samt två vattendrag Hånälven och kanalen i Töcksfors hyser ett kräftbestånd. FVOF har aldrig blivit drabbade av kräftpesten.

Utplantering av gös i Töck har utförts vid ett tillfälle under mitten av 1990-talet, ev. har även utsättning av ett fåtal karp par utförts i FVOF. Hånälven är påverkad av reglering, men det har aldrig förekommit klagomål på hur regleringen sköts.

### 9.3 Kalkning

Töck-Hurrsjöarnas Fvof ingår i åtgärdsområde nr 102 och 103 enligt länsstyrelsens kalkningsverksamhet. De första kalkningarna i området startade 1984, idag kalkas 12 olika sjöar och mindre tjärnar varav 2 av sjöarna är belägna i Norge. Dessutom kalkas 32 olika våtmarker. Enligt länsstyrelsens kalkningsplan är den kemiska målsättningen med kalkningen att hålla ett pH över 6 i de kräftförande vattendragen, flodkräftor ingår som ett motiv för kalkningen i Nedre Hurrsjön.

Provtagningspunkter med avseende på vattenkemin (pH och alkalinitet) finns bl.a. i Nedre Hurrsjöns utlopp och i Hånälven, i dessa två punkter utförs 5 provtagningar per år. De vattenkemiska värdena ger endast en ögonblicksvärde för tillståndet i lokalerna. Riktlinjerna för pH och alkalinitet för flodkräftor är att pH inte bör understiga 6,5 och alkaliniteten bör vara högre än 0,1 mekv/l. Även bottenfaunaundersökningar utförs i Hånälven som ett kompletterande till de vattenkemiska parametrarna.

### 9.4 Risken för spridning av kräftpest till Töck-Hurrsjöarnas FVOF


Tänkbara vägar för spridning av kräftpest till fvof, är framförallt via illegal utplantering av signalkräfter samt Dalslands kanals båttrafik genom fvof. Dalslands kanal passerar genom kanalen i Töcksfors vilket medför risker med transporter av fuktiga redskap från nedströms belägna områden som hyser signalkräfter. Nedre Hurr och Ärtetjärnsviken har kommunala badplatser.



Conny Haglund letar kräftor i Almtjärn

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

# Töck-Hurrsjöarna fiskevårdsområde



### 9.5 Var man teoretiskt kan stoppa en annalkande pesthärd

Vid en lokal i FVOF är det teoretiskt möjligt att stoppa en vandrande pestepidemi som är på väg uppströms i systemet. Vid utloppet ur Nere Hurrsjön finns en regleringsdamm, där man kan strypa flödet samtidigt som man kan kalka vattnet nedströms dammen med släckt kalk för att skapa en kräftfri zon. Lyckas man med detta kan man rädda kräftbeståndet i Nedre Hurrsjön från pesthärderna.

### 9.6 Minkjakt

Någon organiserad minkjakt bedrivs inte i FVOF, generellt har dock minkbeståndet minskat kraftigt under senare år. Risken finns alltid att ett minkbestånd snabbt återetablerats i takt med att kräftbeståndet ökar.

### 9.7 Kräftvårdande åtgärder för hela Töck-Hurrsjöarnas FVOF

- Informationstavlor för att förhindra spridning av kräftpest bör uppföras samt ett samarbete med campingplatsen för informationsspridning.
- Årlig inrapportering av fångsten både hur många som släpptes tillbaka och hur många som tillvaratogs av dem som fiskar kräftor till kräftansvarig i FVOF.
- Säkerställa vattenföringen i Hånälven
- Provfiske i Nedre Hurrsjön, Hånviken, Obyviken, Ärtetjärnsviken samt Töck.
- Minkjakt

### 9.8 Nedre Hurrsjön och Hånälven

Nedre Hurrsjön avvattnar fyra sjöar och några mindre tjärnar. Nedre Hurr



Foto: Per Brunström, Hushållningssällskapet

*Det är spännande att kolla kräftfåvarna!*

har goda bottenförhållanden för kräftor. Tillrinningsområdet består huvudsakligen av skogsmark. Endast en handfull fastigheter finns runt Nedre Hurr och uppströms i systemet. Sjön har en total strandlinje på ca 1 mil och en stor del av denna sträcka har goda bottenförhållanden för kräftor. Sjön är påverkad av reglering, vilken effekt detta har på kräftbeståndet är okänt, regleringen verkar inte påverka kräftorna nämnvärt.

Hånälven är ett mindre reglerat vattendrag. Nedströms turbinutsläppet och ut till Hånviken finns goda biotoper för kräftor. Sträckan från turbinutsläppet och ca 200 m uppströms till regleringsdammen är helt beroende av spillvatten genom regleringsdammen.

### 9.9 Vattenkemi

Sedan 1999 har pH i Nedre Hurrsjön och Hånälven, varierat mellan 6,1 och 7,1. Alkaliniteten har understigit 0,1 mekv/l vid 9 mätillfällen av totalt 58

mätillfällen, det lägst uppmätta värdet är 0,05 mekv/l. Hånälvens bottenfauna har undersökts 1992, 1995, 1999 och 2002. De tre första undersökningarna bedömdes vara att bottenfaunan var "ej eller obetydligt påverkad av försurning" medan den senaste undersökningen 2002 bedömdes vara "betydligt påverkad av försurning". Bedömningen grundar sig på avsaknaden av försurningskänsliga sländarter och flera försurningskänsliga grupper, som snäckor och musslor.

### 9.10 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

Kräftor planterades ut i Nedre Hurr på senare tid. Det började under 1950 och 1960 talet, utsättningskräftorna hämtades från sjön Töck. Det utvecklade sig till ett bra kräftbestånd, kräftor fanns runt hela sjön men i olika omfattning. 1974-75 börjades en försämring av kräftbeståndet att märkas och i takt med att kräftbeståndet minskade hamnade kräftorna och kräftfisket i glömska. 2004 kunde man se att kräftorna håller på att återhämta sig, i lampans sken kunde man se att det rådde full aktivitet nattetid efter stränderna vid Nedre Hurr. Kräftbeståndet i Nedre Hurr är på väg att återigen återetableras mycket troligt pga. kalkningsverksamheten i systemet.

### 9.11 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden för Nedre Hurrsjön och Hånälven

Anledningen till tillbakagången i Nedre Hurr under 1970-talet är ganska uppenbar. Bakgrundsdata för kalkningsåtgärderna i systemet är bl.a grundade på uppmätta pH-värden

**Tabell 2 Data för de sjöarna/vattendragen som har hyst eller hyser ett flodkräftbestånd i Töck-Hurrsjöarnas FVOF**

Sjönamn/vattendrag	Areal (ha)	Strandlinje(km)	Vattendragsläng(km)	H.ö.h
Nedre Hurr	96	11,1	134	
Töck	340	32	190 - 99	
Hånälven		0,7	130 - 119	
Kanalen i Töcksfors		1	107	

mellan 5,0-6,0 med lägsta notering på 3,6. Förurningen i kombination med minkens framfart och ett hårt fiske efter kräftor är mycket troligt anledningen till att kräftbeståndet successivt minskade, däremot dog kräftorna aldrig helt ut.

De största hoten mot Nedre Hurr-sjön och Hånälven är att kalkningsverksamheten upphör samt framförallt illegal utplantering av signalkräftor. Risken med att få in smittan i systemet är även via badplatserna. Kommer en pesthärd vandrande uppströms från t ex Töck kan man inte hindra härden från att nå Hånälven, däremot kan man hindra den från att nå in i Nedre Hurr-sjön genom vandringshindret i dess utlopp.

Nedre Hurr-sjöns kräftbestånd kan även påverkas mycket negativt om regleringsnivåerna i sjön fluktuerar. Man bör vara vaksam med hur vattendomen är fastställd för att undvika framtida problem.

### 9.12 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Nedre Hurr-sjön och Hånälven

- Informationstavlor för att förhindra spridning av signalkräftor och kräftpest från framförallt vid badplatserna och intill E 18.
- Provfiske för att inventera flodkräftbeståndet i Nedre Hurr, Hånviken, Öbyviken samt Ärtetjärnsviken
- Börja fiska kräftor. Fiska mer och oftare kräftor med ett riktat fiske på stora kräftor. Hanar >10 cm och honor >10,5 (möjligen 10,5 cm resp. 11,0 cm)
- Undersök vattendomen för att säkerställa en trygg vattenföring i Hånälven
- Undersök flera vattens lämplighet för en återintroduktion av kräftor t ex Torbetjärn
- Flytta kräftor från kräftförande delar av T ex Hånälven och Håviken till Öbyviken, och Ärtetjärnsviken mm.
- Undersök behovet av biotopvårdande åtgärder
- Intensivjakt på mink med årlig inrapportering.

### 9.13 Töck och "Kanalen"

Töck och dess utlopp "Kanalen" genom Töcksfors avvattnar ett stort område med många vatten. Det råder stor en livlig båt- och kanot trafik genom systemet. Töck är en sjö med varierande omgivningar av bl. a jordbruksmark, barr- och blandskogsträng samt tätorter. Töck har på senare år sakta börjat att "växa igen" vilket kräftor är direkt missgynnade mot, eftersom bon och gömslen begravs av vegetationen. Töck påverkas av regleringen, periodvis är stränderna blottade, vilket medför att kräftorna måste följa vattenståndet och söka skydd på djupare vatten. De djupare delarna av sjön kan mycket väl ha mindre lämpade botten vilket missgynnar kräftorna.

### 9.14 Vattenkemi

En provtagningspunkt finns vid utloppet ur Töck och de vattenkemiska parametrarna har sedan 1999 varit mycket stabila och tillfredställande. pH har varierat mellan 6,1 och 6,8



Den gamla "goda tiden" med flodkräftfisket är på väg tillbaka!

Foto: Per Adolphson, Fiskeriverket

medan alkaliniteten aldrig understigit 0,06 mekv/l vid mätstillfällena.

### 9.15 Fakta och historik över kräftbeståndet fram tills idag

Enligt uppgift fanns det i början på 1900-talet ont om kräftor i Töck och något kräftfiske bedrevs inte under denna period. Efter 1940-talet började dock en ökning av kräftbeståndet att ske och man började fiska kräftor. Anledningen till varför det inte fanns fiskbara kräftbestånd under den första delen av 1900-talet är okänt. En anledning kan vara att det under denna period bedrevs en aktiv timmerflottning i systemet. Flottningen minskade i omfattning under 1940 och upphörde 1960. Under 1970-talet påbörjades en försämring av kräftbeståndet, troligen orsakat av en kombination av förurningen, mink, reglering som påverkar Töcks stränder och ett hårt fiske, det bedrevs nämligen en handel med kräftor under 1960 och 1970-talet.

Kräftorna har aldrig helt försvunnit, 2004 finns det i Töck enstaka kräftor, något aktivt fiske bedrivs inte i sjön. Däremot finns det ett gott bestånd i "Kanalen", där kan allmänheten köpa ett fiskekort för kräftfiske under 3 da-

gar och med 5 burar. De senaste åren har kräftbeståndet successivt ökat i kanalen, 2005 kunde vissa burar innehålla 25-30 kräftor vilket visar på mycket goda tätheter.

### 9.16 Orsaker till tillbakagången av flodkräftorna – Hotbilden

Förurningen i kombination med minkens framfart och ett hårt fiske efter kräftor är mycket troligt anledningen till att kräftbeståndet successivt minskade, däremot dog kräftorna aldrig helt ut. Det största hotet mot Töck är den livliga båttrafiken, framförallt när det nu förekommer signalkräftor nedströms i systemet. Teoretiskt kan båt- och kanottrafiken transportera kräftpesten med fuktiga redskap som varit i direktkontakt med kräftpesten och därmed sprida smittan vidare uppströms till Töck. Men kräftpesten har aldrig förekommit i Töck, trots att båttrafiken varit livlig i många år. Den störta risken med att få in kräftpest är via illegala utplanteringar med signalkräftor. Ett ytterligare hot, är camping- och badplatsen i Töcksfors. Under sommarhalvåret är camping- och badplatsen välbesökt, och teoretiskt är det möjligt att campinggäster fraktar smittat vatten eller delar av kräftor från an-

dra delar av landet. T ex. via barns leksaker, badkläder mm. som inte hunnit torkat innan de hamnar i Foxen/Töck.

### 9.17 Förslag till åtgärder/handlingsprogram för Töck och "Kanalen"

- Provfiska Töck, för att undersöka förekomsten av flodkräftor
- Dokumentera det årliga fisket i "Kanalen" för att följa upp utvecklingen av kräftbeståndet. T ex. kan man till varje sålt fiskekort bifoga ett fångstkort där man rapporterar in antal, kön och storlekar till FVOF.
- Informationstavlor för att förhindra spridning av kräftpest bör uppföras vid väl strategiska punkter. Framförallt vid kanalen där mycket folk samlas samt i samband med försäljning av fiskekortet.
- Undersöka möjligheten till spridning av kräftor från "Kanalen" till lämpliga lokaler i Töck.
- Kartlägg de lokaler i Töck som tidigare hyste goda bestånd av flodkräftor. Finns behov av biotopvårdande åtgärder?
- Flytta kräftor från kanalen till lokaler som tidigare hyste goda kräftbestånd.



Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet

## Tillvägagångssätt vid att misstanke om pestsmittade flodkräftor

Från och med augusti 2002 genomför Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), fiskavdelningen, kräfhälsokontrollerna i naturvatten och odlingar. Döda och döende kräftor i ett naturvatten som misstänks vara drabbade av pesten undersöks också av SVA. Mest fördelaktigt är att skicka iväg kräftor som är döende, dvs. de är ännu inte döda vid insamlandet. Detta för att säkerställa diagnosen kräftpest, genom att isolera kräftpestsvampen *Aphanomyces astaci* från insjuknade kräftor. Kräftor som påträffats döda är mindre lämpade för analys men bör också insamlas. Vid insamling av döda kräftor bör i första hand de färskaste exemplaren väljas. Vid insändning av flera kräftor skall respektive kräfta märkas och noteras om de var döda eller döende vid insamlandet. Om möjligt är ca 10 kräftor lämpligt för analys, både döda, döende eller konserverade.

Vid ett fåtal påträffade döda (2-3) kräftor vid ett vatten kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring för senare analyser, samtidigt som man undersöker sitt vatten efter ytterligare döende eller döda kräftor. Vid upptäckt av döende kräftor vid tidpunkter (fredagar, helger mm.) som inte är lämpligt för sändning till Uppsala kan kräftorna konserveras enligt nedan. Vid sändning till SVA av färska eller frysta kräftor skall de vara framme dagen efter. Kontakta fiskerikonulenten vid Länsstyrelsen och framförallt SVA innan kräftorna skickas för att bästa insamlings- och insändningsförfarandet för dagen kan anpassas. Om det är vid sådan tidpunkt eller att fiskerikonulenten på länsstyrelsen inte är nåbar, kan enbart Thorbjörn Hongslo (fiskavdelningen) eller jourhavande på SVAs fiskavdelning kontaktas.

- Materialet (döda eller döende kräftor) insändes både i färskt och konserverat och om det är möjligt helst i levande tillstånd (döende kräftor).

- Materialet (kräftorna) bör helst förpackas individuellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

- Konserverat material konserveras fortast möjligt i 70 % spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alternativt T-röd 2/3 och 1/3 vatten).

- Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kylskåps-temperatur (0-4°C snarast efter insamlandet), vid iväg-sändandet skall kräftorna vara välkylda i kylboxar eller

liknande. Se till att kräftorna inte är i direktkontakt med is/kylklampor för att undvika frostsador på kräftorna.

- Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att föredra.

- Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn Hongslo) skall aviseras av insändaren snarast möjligt eller helst 7-10 dagar före insändandet av prover. Proverna insändes i länsstyrelser och kommuners regi.

### För närmare information om insamlings- och insändningsförfarandet kontakta:

SVA 018-67 40 00 (fiskavdelningen),  
Thorbjörn Hongslo (018- 67 42 27)  
SVA, Fiskavdelningen, Travvägen 20, 751 89 Uppsala

Uppgifter om kräftbeståndet, vattenområde, lokal, tidpunkt, antal sjuka och döda kräftor bifogas om möjligt provet. Eventuell fiskdöd, förändringar i vattnet, fysiska ingrepp i vattenområdet och tidigare uppgifter om hälsoproblem i kräftbeståndet meddelas om möjligt också.

Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar meddelas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta inte är möjligt meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdelningens jourhavande är uppdaterad avseende pågående fall av kräftundersökningarna.



## SYFTE

Syftet med projekt **Astacus** är att vidareutveckla gränsområdet mellan Norge och Sverige till ett skyddsområde/kärnområde för flodkräfta.

Flodkräftsbestånden skall återetableras och stärkas så att de kan utgöra underlag för ett bärkraftigt rekreativt- och näringsfiske. Formerna för rekreativt- och näringsfiske skall utvecklas inom projektet.

Kräftorna skall indikera rena och friska vatten som skapar en positiv inställning och ett starkt engagemang till att ta tillvara vattnen.

Målsättningen med projektet kan formuleras i två delar där delarna utgör förutsättningar för varandra.

1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området.
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreativt fiske och näringsfiske.

## FINANSIERING

Projekt **Astacus** finansieras och drivs av följande institutioner och företag;

Europeiska utvecklingsfonden, Norske statlige IR-midler, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Fylkesmannen och kommunen i Østfold, Fylkesmannen och kommunen i Akershus, Fylkesmannen och kommunen i Hedmark, Fiskeriverket, Dals-Eds kommun

## PROJEKTLEDNING

Ansvariga projektledare för **Astacus** är;

**Tomas Janson**, Hushållningssällskapet i Värmland.

Tel. 054-54 56 18, 0708-29 09 23, tomas.jansson@hush.se

**Øystein Toverud** på Utmarksavdelningen for Akerhus og Østfold.

Tel 0698-111 11, fax 0698-127 27, oystein.toverud@havass.skog.no

### **Projektägare:**

Hushållningssällskapet i Värmland, Lillerud, 660 50 Vålberg

054-54 56 00, [www.hush.se/s](http://www.hush.se/s)

Utmarksavdelningen for Akershus og Østfold, Pb 174, N 1871 Ørje

0047-69 81 11 22 [www.utmarksavdelingen.no](http://www.utmarksavdelingen.no)



[www.astacus.org](http://www.astacus.org)